

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
M10 AD



- I. Nombre Comercial** : M10 AD
- II. Ingrediente Activo** : Fósforo, Potasio, Boro, Manganeso y Molibdeno
- III. Tipo** : Macro y microelementos
- IV. Concentración** : 21 % Fósforo; 28 % Potasio; 0,14 % Boro; 0,14 % Manganeso; 0,014 % Molibdeno (% p/v)
- V. Formulación** : Líquido
- VI. Modo de Acción** : Absorción foliar y/o radicular
- VII. Proveedor** : CHEMIE® S.A.
- VIII. Autorización SAG** : No Corresponde
- IX. Características** : M10 AD es un producto mineral líquido caracterizado por una exclusiva relación entre fósforo y potasio con micronutrientes sinérgicos.
- X. Compatibilidad** : Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo. No compatible con calcio ni zinc.
- XI. Fitotoxicidad** : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

XII. Aplicaciones :

Cultivo	Dosis mL/hl	Dosis L/ha	Momento de Aplicación y Observaciones
Uva de mesa y vinífera	300-500	7,5-10	Inicio de enero o ablande y dos aplicaciones más cada 7 días. En post cosecha para madurar ramas.
Durazno, Damasco, Cerezo, Ciruelo, Nectarino, Olivo, Avellano, Almendro, Nogal	250-500	7,5-10	Inicio de maduración y dos aplicaciones más cada 7 días. En post cosecha para lignificación de cargadores y yemas.
Manzano, Peral, Kiwi, Palto	300-500	7,5-10	Aplicar en floración, inicio de maduración y dos aplicaciones más cada 7 días. En post cosecha para madurar ramas.

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
M10 AD



Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas	300-600	7,5-10	Antes de la floración, crecimiento de los frutos y antes de la maduración
Frutillas, Frambuesas, Arándanos, Grosellas, Zarzaparrillas	150-350	7,5-10	Al trasplante (frutillas). Inicio pinta y y dos aplicacioes más cada 7 días. En post cosecha para madurar ramas.
Viveros (hortícola, frutales)	150 -350		Semanalmente o cuando las plantas vegetan demasiado.
Ornamentales, flor cortada	150-350		Cada 10-15 días o cuando las plantas vegetan demasiado.
Hortalizas de hoja (lechuga, apio, etc.)	150-250		Al trasplante y 15 días antes de la cosecha
Tomate, Pimentón, Papas, Ají	300-600	5 - 8	Al trasplante, antes de floración, al crecimiento de frutos y antes de maduración.
Melón, Sandía, Pepino, Zapallo	250-400		Al trasplante, antes de floración, al crecimiento de frutos y antes de maduración.
Tomate de industria		4 - 7	3-4 aplicaciones foliares (60-15 días antes de la recolección).
Trigo, avena, maíz, arroz		2	Vía foliar: 5-15 días antes de la formación de la espiga.

XIII. Precauciones

: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.