

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Chloroacetanilide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** No existe antídoto específico. El tratamiento es netamente sintomático.
- **Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 (gratuito), ESSALUD: 0801-10200, (línea gratuita), AGRO KLINGE: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Exocet rice®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Butachlor ..... 600 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg PQUA N° 1451-SENASA

Titular de Registro,  
**AGRO KLINGE S.A.**  
Calle Rene Descartes 311.  
Urb. Santa Raquel 2º Etapa. Ate.  
Lima-Perú



Formulado por:  
**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Calle René Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2º Etapa, Ate,  
Lima-Perú

Distribuido por:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of 503.  
Santiago de Surco.  
Lima - Perú.  
Teléfono: (01) 641-0000



CONTENIDO NETO: 200 Litros

Lote No.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EXOCET RICE es un herbicida sistémico, selectivo que controla, principalmente en pre-emergencia, malezas gramíneas, cyperáceas anuales y algunas malezas de hoja ancha, según el cuadro de uso.

- Aplicar EXOCET RICE utilizando el envase aplicador, directamente sobre la poza de arroz con una lámina de agua de 5 a 10 cm. Para una buena eficacia del herbicida, mantener el agua de la poza retenida y sin circulación por 2 a 3 días. Posteriormente, continuar con la práctica de riego normal. Las aplicaciones deben hacerse en pre-emergencia y, en casos extremos, cuando las malezas tengan no más de 2 hojas verdaderas.
- Verter el producto en el envase aplicador y utilizarlo directamente sobre la poza. Abanicar el envase aplicador, asperjando el producto de izquierda a derecha, tratando de alcanzar 3 a 4 metros de distancia por vez, repetir la operación en forma continua, hasta terminar la dosis recomendada.

Nota: Para la presentación de 500 ml utilizar el mismo envase como aplicador.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

| Cultivo | Malezas                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | Dosis<br>(L/ha) | P.C.<br>Días | L.M.R<br>(ppm) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
|         | Nombre común                                                                                                     | Nombre científico                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |                |
| Arroz   | “Yuyo”<br>“Moco de pavo”<br>“Pajilla”<br>“Cadillo”<br>“Pata de gallina”<br>“Coquito”<br>“Lechera”<br>“Verdolaga” | <i>Amaranthus spinosus</i><br><i>Echinochloa crusgalli</i><br><i>Leptochloa uninervia</i><br><i>Cenchrus echinatus</i><br><i>Eleusine indica</i><br><i>Cyperus esculentus</i><br><i>Euphorbia hirta</i><br><i>Portulaca oleracea</i> | 3-4             | N.A          | 0.1            |

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos  
N.A. : No aplicable, por no dejar residuos en la cosecha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación al inicio de la campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá reingresar al campo después de 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

A la dosis recomendada no es fitotóxico en el cultivo de arroz.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



Dimensiones: 200 mm x 330 mm