

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
FOLIACON



I. Nombre Comercial	: FOLIACON
II. Ingrediente Activo	: Nitrógeno, Calcio y Magnesio
III. Tipo	: Macroelementos
IV. Concentración	: 13,2 % Nitrógeno total; 13,2 % Nitrógeno nítrico; 15 % Calcio; 7,5 % Magnesio (% p/v)
V. Formulación	: Líquido
VI. Modo de Acción	: Absorción foliar y radicular
VII. Proveedor	: CHEMIE® S.A.
VIII. Autorización SAG	: No Corresponde
IX. Características	: FOLIACON es un fertilizante mineral líquido a base de calcio, magnesio y nitrógeno. Proporcionado a la planta la entrega balanceada de nutrientes que permite: - Prevenir y corregir desordenes fisiológicos como palo negro o uva débil. - Previene y corrige las carencias de calcio y magnesio. - Estimula el desarrollo vegetativo. - Uniformiza e incrementa el tamaño y el peso de los frutos. - Aumenta la firmeza y la vida post-cosecha de frutos y hojas. Se recomienda el uso durante el crecimiento de la vegetación y el engorde de los frutos.
X. Compatibilidad	: Este producto se puede mezclar con herbicidas y productos fitosanitarios de uso normal en la agricultura. No es compatible con productos a base de fósforo y azufre. En cultivos o variedades sensibles, se recomienda realizar un ensayo previo en una pequeña parte del cultivo antes de tratar extensivamente.
XI. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
FOLIACON



XII. Aplicaciones

:

Cultivo	Dosis mL/hl	Dosis L/ha	Momento de Aplicación y Observaciones
Uva de mesa y vinífera	4-5	10-20	En brotes de 20 a 40 cm y de 2 a 4 aplicaciones a partir de baya recién cuajada, dependiendo del historial de presencia de palo negro o de bayas débiles.
Cerezo, Durazno, Damasco, Ciruelo, Nectarino	2-4	10-15	Antes y después de endurecimiento de carozo
Manzano, Peral, Kiwi, Palto	3-5	10-20	2 aplicaciones durante engorde de fruto
Limones, Naranjos, Mandarinos, Pomelos, Tangelos, Clementinas	3-5	10-20	2 aplicaciones a partir de frutos de diámetro de 2 cm.

XIII. Precauciones

: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 0 - 45 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.