



Teldor®
50 PM

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
Utilizar protección ocular hermética durante el manipuleo y aplicación.
Evitar la inhalación y contacto con la piel usando equipo y ropa protectora.
Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.

No desatorar las boquillas soplando con la boca.
No comer ni fumar durante la aplicación.
No aplicar en dirección contraria al viento.
No verter los restos del caldo de suspensión sobre vegetación útil, fuentes de agua (lagos, ríos, estanques, acequias).
Usarlo en sus envases originales y almacenarlo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados.

Transportarlo y almacenarlo en sus envases originales debidamente etiquetados y bien cerrados.
Mantenerlo lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar ni transportar junto con productos alimenticios, bebidas, forrajes y medicinas.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retirar las prendas contaminadas y lavar la piel con abundante agua y jabón. Mantener al paciente abrigado en un lugar adecuado. En caso de ingestión oral, dar a beber 1 ó 2 vasos de agua e inducir al vómito, sólo si el paciente está consciente. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático.

Antídoto: No existe un antídoto específico.

teléfonos de emergencia en caso de intoxicación:
ICOTOX: 0800-1-3040 CISP/ROQUIM: 0800-50847



Teldor®
50 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Fenhexamid, 500 g/kg
Aditivos, csp 1 kg

Reg.: PQUA 004-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience
D-51368
Leverkusen
Alemania

Importado y Distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima-Perú
Tel. 211 3800

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido

Neto:

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer



Teldor®
50 PM

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Peligroso a peces, no contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos y envases vacíos. Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos".

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

"Después de usar el contenido de la caja, inutilícela rompiéndola o perforándola y deposítala en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. En caso de derrames recoger cuidadosamente el producto sin formar nubes de polvo al barrer, luego lavar la zona afectada con agua, disponer el producto en envases herméticos".

Teldor® 50 PM

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INFORMACIÓN GENERAL

Teldor 50 PM es un fungicida preventivo perteneciente al grupo de las hydroxianilidas. Empleado para el control de *Botrytis* en vid y alcachofa. Debido a su nuevo modo de acción no presenta problemas de resistencia. Inocuo para enemigos naturales y abejas.

INDICACIONES DE USO:

Se aplica en espolvoreo en mezcla con azufre en polvo (25 kg/ha). Es recomendable preparar previamente una mezcla bien uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda hacer tres aplicaciones de Teldor 50 PM en los siguientes momentos de desarrollo del cultivo: cierre de racimos, envero y pre-cosecha.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones de uso.

USO ESPECÍFICO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
Usarlo sólo en los cultivos y enfermedades autorizadas

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS Kg/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Vid	<i>Botrytis</i>	<i>Botrytis cinerea</i>	1.2-1.5	3	5
Alcachofa	<i>Botrytis cinerea</i>	<i>Botrytis cinerea</i>	0.75	N/d	0.05

PC=Período de carencia(días) LMR=Límite Máximo de Residuos(ppm)

Aplicar las dosis alta cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad.

Nota al comprador: "El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

