

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS”**

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;
POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018;
CISPROQUIM: 080-050-847**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destinodispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Virus de la poliedrosis nuclear (NPV)2 billones PIB/ml
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 004-SENASA-PBA-ACBM

**Titular del registro, Importado y
distribuido por: POINT ANDINA S.A.**
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono +51 (01) 348 1018



Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town, Yixing,
Jiangsu 214217. China.
Teléfono (86 - 510) 8785
1001

Contenido Neto: 300 ml
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/200L	L/ha		
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.35-0.50	-	N.A.	N.A.
Arándano	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.40	-	N.A.	N.A.
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.30	-	N.A.	N.A.
Brócoli	Polilla del dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Cacao	Mazorquero del cacao	<i>Carmenta foraseminis</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
	Gusano picador de la hoja	<i>Epismopalpus ligrosellus</i>	-	1.5**	N.A.	N.A.
Granada	Gusano perforador del ápice de la bellota	<i>Pococera atramentalis</i>	-	1.50 - 1.75	N.A.	N.A.
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
Olivo	Margaronia	<i>Palpita persimilis</i>	-	1.25 - 1.50	N.A.	N.A.
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	1.50 - 2.00	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
	Gusano ejercito	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Vid	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.27-0.30*	1.20	N.A.	N.A.
Arándano	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.4-0.5	-	N.A.	N.A.

* Gasto de agua en el cultivo de vid: 800-900 L/ha ** Gasto de agua en el cultivo de espárrago: 1500-2000L/ha
PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón) N.A.: No aplica.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **EN VIVO SC®**, no es tóxico por vía oral y dermal, sin embargo, siendo una sustancia de origen orgánico, se recomienda en caso de ingestión, inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda mover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Antídoto: No posee antídoto.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;
POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018; CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

En Vivo SC

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO


INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Virus de la poliedrosis nuclear (NPV).....2 billones PIB/ml
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 004-SENASA-PBA-ACBM



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular del registro:
POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono +51 (01) 348 1018

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu 214217. China.
Teléfono (86 - 510) 8785 1001

Contenido Neto: 500 ml

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EN VIVO SC®, es un insecticida biológico con acción principalmente de ingestión. Cuando las hojas tratadas con **EN VIVO SC®** son ingeridas, la acción que es producida por el conjunto de virus que contiene el producto, causan la infección viral en el hospedero específico y finalmente produce la muerte de las larvas. Para mantener activos los cuerpos de inclusión durante períodos largos (meses, años), se recomienda mantener **EN VIVO SC®** en lugares frescos hasta el momento de su aplicación.

Sistemas de preparación y aplicación

Para la preparación de la mezcla es necesario regular el pH del agua, ya que con pH alcalino se hidroliza el virus. El pH ideal es 6.5. Llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto, agitar y mezclar homogéneamente, completar con agua hasta llenar el tanque. Aplicar en aspersión con equipos manuales y/o motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Evitar las horas de mayor radiación solar y alta temperatura, debido a que los rayos ultravioletas degradan los viriones.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.35-0.50	-	N.A.	N.A.
Arándano	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.40	-	N.A.	N.A.
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.30	-	N.A.	N.A.
Brócoli	Polilla del dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Cacao	Mazorquero del cacao	<i>Carmenta foraseminis</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
	Gusano picador de la hoja	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	-	1.5**	N.A.	N.A.
Granada	Gusano perforador del ápice de la bellota	<i>Pococera atramentalis</i>	-	1.50 - 1.75	N.A.	N.A.
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
Olivo	Margarona	<i>Palpita persimilis</i>	-	1.25 - 1.50	N.A.	N.A.
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	1.50 - 2.00	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
	Gusano ejercito	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Vid	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.27-0.30*	1.20	N.A.	N.A.
Arándano	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.4-0.5	-	N.A.	N.A.

* Gasto de agua en el cultivo de vid: 800-900 L/ha ** Gasto de agua en el cultivo de espárrago: 1500-2000L/ha
PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón) N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico. En el cultivo de espárrago considerar entre 3 o 4 días entre aplicaciones.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No debe ser mezclado con pesticidas de reacción alcalina. Cuando se mezcla con pesticidas químicos neutros, debe ser usado inmediatamente.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **EN VIVO SC®**, no es tóxico por vía oral y dermal, sin embargo, siendo una sustancia de origen orgánico, se recomienda en caso de ingestión, inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda mover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Antídoto: No posee antídoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU:106;
POINT ANDINA S.A: (01) 348- 1018; CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- VACÍOS:** • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Virus de la poliedrosis nuclear (NPV).....2 billones PIB/ml
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 004-SENASA-PBA-ACBM



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular del registro:
POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.

Wan Shi Town,Yixing, Jiangsu 214217. China.
Teléfono (86 - 510) 8785 1001

Contenido Neto: 1L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EN VIVO SC®, es un insecticida biológico con acción principalmente de ingestión. Cuando las hojas tratadas con **EN VIVO SC®** son ingeridas, la acción que es producida por el conjunto de virus que contiene el producto, causan la infección viral en el hospedero específico y finalmente produce la muerte de las larvas. Para mantener activos los cuerpos de inclusión durante períodos largos (meses, años), se recomienda mantener **EN VIVO SC®** en lugares frescos hasta el momento de su aplicación.

Sistemas de preparación y aplicación

Para la preparación de la mezcla es necesario regular el pH del agua, ya que con pH alcalino se hidroliza el virus. El pH ideal es 6.5. Llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto, agitar y mezclar homogéneamente, completar con agua hasta llenar el tanque. Aplicar en aspersión con equipos manuales y/o motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Evitar las horas de mayor radiación solar y alta temperatura, debido a que los rayos ultravioletas degradan los viriones.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.35-0.50	-	N.A.	N.A.
Arándano	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.40	-	N.A.	N.A.
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.30	-	N.A.	N.A.
Brócoli	Polilla del dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Cacao	Mazorquero del cacao	<i>Carmentia foraseminis</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
	Gusano picador de la hoja	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	-	1.5**	N.A.	N.A.
Granada	Gusano perforador del ápice de la bellota	<i>Pococera atramentalis</i>	-	1.50 - 1.75	N.A.	N.A.
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
Olivo	Margarona	<i>Palpita persimilis</i>	-	1.25 - 1.50	N.A.	N.A.
Patto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	1.50 - 2.00	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
	Gusano ejercito	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Vid	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.27-0.30*	1.20	N.A.	N.A.
Arándano	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.4 - 0.5	-	N.A.	N.A.

* Gasto de agua en el cultivo de vid: 800-900 L/ha ** Gasto de agua en el cultivo de espárrago: 1500-2000L/ha
PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón) N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico. En el cultivo de espárrago considerar entre 3 o 4 días entre aplicaciones.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: No debe ser mezclado con pesticidas de reacción alcalina. Cuando se mezcla con pesticidas químicos neutros, debe ser usado inmediatamente.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO


INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Virus de la poliedrosis nuclear (NPV).....2 billones PIB/ml
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 004-SENASA-PBA-ACBM



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular del registro:
POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu 214217. China.
Teléfono (86 - 510) 8785 1001

Contenido Neto: 20L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **EN VIVO SC®**, no es tóxico por vía oral y dermal, sin embargo, siendo una sustancia de origen orgánico, se recomienda en caso de ingestión, inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda mover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Antídoto: No posee antídoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.



- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EN VIVO SC®, es un insecticida biológico con acción principalmente de ingestión. Cuando las hojas tratadas con **EN VIVO SC®** son ingeridas, la acción que es producida por el conjunto de virus que contiene el producto, causan la infección viral en el hospedero específico y finalmente produce la muerte de las larvas. Para mantener activos los cuerpos de inclusión durante períodos largos (meses, años), se recomienda mantener **EN VIVO SC®** en lugares frescos hasta el momento de su aplicación.

Sistemas de preparación y aplicación

Para la preparación de la mezcla es necesario regular el pH del agua, ya que con pH alcalino se hidroliza el virus. El pH ideal es 6.5. Llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto, agitar y mezclar homogéneamente, completar con agua hasta llenar el tanque. Aplicar en aspersión con equipos manuales y/o motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Evitar las horas de mayor radiación solar y alta temperatura, debido a que los rayos ultravioletas degradan los viriones.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico. En el cultivo de espárrago considerar entre 3 o 4 días entre aplicaciones.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No debe ser mezclado con pesticidas de reacción alcalina. Cuando se mezcla con pesticidas químicos neutros, debe ser usado inmediatamente.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.35-0.50	-	N.A.	N.A.
Arándano	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.40	-	N.A.	N.A.
Arroz	Pollilla del dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.25-0.30	-	N.A.	N.A.
Brócoli			0.25	-	N.A.	N.A.
Cacao	Mazorquero del cacao	<i>Carmentis foraseminis</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
	Gusano picador de la hoja	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	-	1.5**	N.A.	N.A.
Granada	Gusano perforador del ápice de la bellota	<i>Pococera atramentalis</i>	-	1.50 - 1.75	N.A.	N.A.
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
Olivo	Margarona	<i>Palpita persimilis</i>	-	1.25 - 1.50	N.A.	N.A.
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	1.50 - 2.00	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
	Gusano ejercito	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Vid	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.27-0.30*	1.20	N.A.	N.A.
	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.4- 0.5	-	N.A.	N.A.

* Gasto de agua en el cultivo de vid: 800-900 L/ha; ** Gasto de agua en el cultivo de espárrago: 1500-2000L/ha
PC: Período de carencia en días; LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón); N.A.: No aplica.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **EN VIVO SC®**, no es tóxico por vía oral y dermal, sin embargo, siendo una sustancia de origen orgánico, se recomienda en caso de ingestión, inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda mover a la persona del área contaminada, retirar ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Antídoto: No posee antídoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;
POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018; CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Virus de la poliedrosis nuclear (NPV).....2 billones PIB/ml
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 004-SENASA-PBA-ACBM



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular del registro:
POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:

POINT AGRO - CHINA LTD.

Wan Shi Town,Yixing, Jiangsu 214217. China.
Teléfono (86 - 510) 8785 1001

Contenido Neto: 200L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EN VIVO SC®, es un insecticida biológico con acción principalmente de ingestión. Cuando las hojas tratadas con **EN VIVO SC®** son ingeridas, la acción que es producida por el conjunto de virus que contiene el producto, causan la infección viral en el hospedero específico y finalmente produce la muerte de las larvas. Para mantener activos los cuerpos de inclusión durante periodos largos (meses, años), se recomienda mantener **EN VIVO SC®** en lugares frescos hasta el momento de su aplicación.

Sistemas de preparación y aplicación

Para la preparación de la mezcla es necesario regular el pH del agua, ya que con pH alcalino se hidroliza el virus. El pH ideal es 6.5. Llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto, agitar y mezclar homogéneamente, completar con agua hasta llenar el tanque. Aplicar en aspersión con equipos manuales y/o motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Evitar las horas de mayor radiación solar y alta temperatura, debido a que los rayos ultravioletas degradan los viriones.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.35-0.50	-	N.A.	N.A.
Arándano	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.40	-	N.A.	N.A.
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.30	-	N.A.	N.A.
Brócoli	Pollilla del dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Cacao	Mazorquero del cacao	<i>Carmenta foraseminis</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
	Gusano picador de la hoja	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	-	1.5**	N.A.	N.A.
Granada	Gusano perforador del ápice de la bellota	<i>Pococera atramentalis</i>	-	1.50 - 1.75	N.A.	N.A.
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
Olivo	Margarona	<i>Palpita persimilis</i>	-	1.25 - 1.50	N.A.	N.A.
Patto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	1.50 - 2.00	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
	Gusano ejercito	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Vid	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.27-0.30*	1.20	N.A.	N.A.
Arándano	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.4-0.5	-	N.A.	N.A.

* Gasto de agua en el cultivo de vid: 800-900 L/ha ** Gasto de agua en el cultivo de espárrago: 1500-2000L/ha
PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón) N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico. En el cultivo de espárrago considerar entre 3 o 4 días entre aplicaciones.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No debe ser mezclado con pesticidas de reacción alcalina. Cuando se mezcla con pesticidas químicos neutros, debe ser usado inmediatamente.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



“LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

VACÍOS: • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destinodispuesto por la autoridad competente, para su gestión. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Virus de la poliedrosis nuclear2 billones PIB/ml
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 004-SENASA-PBA-ACBM

Titular del registro, Importado y distribuido por:

POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono +51 (01) 348 1018

Contenido Neto: 250 ml

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu
214217. China.
Teléfono (86 - 510) 8785 1001

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.35-0.50	-	N.A.	N.A.
Arándano	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.40	-	N.A.	N.A.
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.30	-	N.A.	N.A.
Brócoli	Polilla del dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Cacao	Mazorquero del cacao	<i>Carmenta foraseminis</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
	Gusano picador de la hoja	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	-	1.5**	N.A.	N.A.
Granada	Gusano perforador del ápice de la bellota	<i>Pococera atramentalis</i>	-	1.50 - 1.75	N.A.	N.A.
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
Olivo	Margarona	<i>Palpita persimilis</i>	-	1.25 - 1.50	N.A.	N.A.
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	1.50 - 2.00	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
	Gusano ejercito	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Vid	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.27-0.30*	1.20	N.A.	N.A.
Arándano	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.4-0.5	-	N.A.	N.A.

* Gasto de agua en el cultivo de vid: 800-900 L/ha ** Gasto de agua en el cultivo de espárrago: 1500-2000L/ha
PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón) N.A.: No aplica.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



PRECAUCIÓN



INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

EN VIVO SC®, no es tóxico por vía oral y dermal, sin embargo, siendo una sustancia de origen orgánico, se recomienda en caso de ingestión, inducir al vómito y consultar al médico. Así mismo se recomienda mover a la persona del área contaminada, retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

SÍNTOMAS

No hay síntomas específicos resultantes conocidos de la sobreexposición aguda, que se produzcan en los seres humanos.

Los estudios en animales han demostrado que este material es de baja toxicidad por las vía oral y dérmica. No es irritante para la conjuntiva ocular, y no es irritante cutáneo o sensibilizador dérmico.

En caso de emergencias llamar a:

Antídoto: No hay antídoto específico

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;

POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018;

CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

• Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. • No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros. • No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables. • Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido viscoso.

Color: verde

Olor: débil olor penetrante.

pH: 6 - 8

Densidad: 1.08 g/ml

Suspensibilidad: Min. 80%

PRESENTACIONES COMERCIALES:

250ml, 300ml, 500ml, 1L, 20L y 200L

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China

Teléfono: (86-510)8785 1001



En Vivo^{sc}

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Virus de la poliedrosis nuclear (NPV).....2 billones PIB/ml
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. N° 004-SENASA-PBA-ACBM

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348 1018

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



PRECAUCIÓN

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EN VIVO SC® es un insecticida biológico con acción principalmente de ingestión. Cuando las hojas tratadas con **EN VIVO SC®** son ingeridas, la acción que es producida por el conjunto de virus que contiene el producto, causan la infección viral en el hospedero específico y finalmente produce la muerte de las larvas. Para mantener activos los cuerpos de inclusión durante períodos largos (meses, años), se recomienda mantener **EN VIVO SC®** en lugares frescos hasta el momento de su aplicación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Para la preparación de la mezcla es necesario regular el pH del agua, ya que con pH alcalino se hidroliza el virus. El pH ideal es 6.5. Llenar el recipiente de la mezcla hasta la mitad con agua, agregar la cantidad de producto, agitar y mezclar homogéneamente, completar con agua hasta llenar el tanque. Aplicar en aspersión con equipos manuales y/o motorizados. Aplicar inmediatamente después de realizada la dilución. Evitar las horas de mayor radiación solar y alta temperatura, debido a que los rayos ultravioletas degradan los viriones.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico. En el cultivo de espárrago considerar entre 3 o 4 días entre apliaciones.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No debe ser mezclado con pesticidas dereacción alcalina. Cuando se mezcla conpesticidas químicos neutros, debe ser usado inmediatamente.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”						
CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Alcachofa	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.35-0.50	-	N.A.	N.A.
Arándano	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.40	-	N.A.	N.A.
Arroz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25-0.30	-	N.A.	N.A.
Brócoli	Polilla del dorso de diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Cacao	Mazorquero del cacao	<i>Carmenta foraseminis</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
	Gusano picador de la hoja	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	-	1.5**	N.A.	N.A.
Granada	Gusano perforador del ápice de la bellota	<i>Pococera atramentalis</i>	-	1.50 - 1.75	N.A.	N.A.
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
Olivo	Margaronia	<i>Palpita persimilis</i>	-	1.25 - 1.50	N.A.	N.A.
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	1.50 - 2.00	N.A.	N.A.
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.30	-	N.A.	N.A.
	Gusano ejercito	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25	-	N.A.	N.A.
Vid	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.27-0.30*	1.20	N.A.	N.A.
Arándano	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.4-0.5	-	N.A.	N.A.

* Gasto de agua en el cultivo de vid: 800-900 L/ha ** Gasto de agua en el cultivo de espárrago: 1500-2000L/ha
PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón) N.A.: No aplica.

