



CORTEVA™
agriscience

biológicos

Phytogard® Potasio

FUNDAMENTOS NUTRICIONALES

Número de Lote: Ver envase.

Fecha de fabricación: Ver envase.

Fecha de Vencimiento: Ver envase.

FERTILIZANTE INORGÁNICO

COMPOSICIÓN

Pentóxido de Fósforo (P_2O_5).....	40% p/v
Óxido de Potasio (K_2O)	20% p/v

CONTAMINANTES

Metales pesados (mg/kg): Cromo hexavalente (Cr VI) 1,9; Cadmio (Cd) 3;
Arsénico (As) 39,9; Plomo (Pb) 5; Mercurio (Hg) 0,9; Níquel (Ni) 10

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS DEL PRODUCTO.

Solubilidad en agua: 100 % soluble a 20°C.

pH: 2,0

Densidad: 1340 g/L a 20° C

ORIGEN: Argentina

Fabricado por Stoller Argentina S.A.U., Calle Pública 7156,
Barrio Aeropuerto, CP 5019, Córdoba, Argentina.

Distribuido por: Stoller de Chile S.p.A., Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó, Chile.
Teléfono: +56 (23) 2362939.

Phytogard®

Potasio

RECOMENDACIONES DE USO

- **PHYTOGARD® POTASIO** es un fertilizante líquido para aplicación foliar y vía riego, formulado en base a fosfito de potasio. Se absorbe rápidamente por la planta, traslocándose en forma ascendente y descendente. Se caracteriza por aportar nutrientes como fósforo y potasio, estimular el crecimiento radicular y de brotes, y aumentar la cuaja.
- **PHYTOGARD® POTASIO** estimula el crecimiento radicular y vegetativo.
- **PHYTOGARD® POTASIO** mejora la cuaja y calidad de la fruta y apoya a la planta a salir adelante frente a situaciones de estrés abiótico.

CULTIVO	DOSIS POR APLICACIÓN	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN
Almendra, Arándano, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Durazno, Frambueso, Frutilla, Mora, Nectarin, Zarzaparrilla	4-6 L/ha (200-300 cc/100L agua)	Aplicar inmediatamente ocurrida la cosecha, repitiendo a los 15 días después.
Avellano Europeo, Nogal y Palto	4-6 L/ha (200-300 cc/100L agua)	Aplicar en cada pico de crecimiento radicular. Retomar aplicaciones inmediatamente ocurrida la cosecha, repitiendo a los 15 días.
CÍTRICOS: Limonero, Clementina, Mandarino, Naranja, Pomelo	4-6 L/ha (200-300 cc/100L agua)	Iniciar las aplicaciones al comenzar el crecimiento vegetativo. Retomar previo a cosecha.
Hortalizas en general y Cultivos anuales	200-300 cc/100L agua	Aplicar durante el período de crecimiento vegetativo o inicio de tuberización, según corresponda.
Kiwi, Vid de Mesa, Vid Vinífera	4-6 L/ha (200-300 cc/100L agua)	Aplicar con brote de 20-30 cm y repetir a los 15 días antes de la floración. Retomar aplicaciones inmediatamente ocurrida la cosecha, repitiendo a los 15 días.
Manzano y Peral	4-6 L/ha (200-300 cc/100L agua)	Iniciar las aplicaciones al comenzar la brotación del cultivo, repitiendo cada 20 días.
Ornamentales	1-2 L/ha	Iniciar las aplicaciones al comenzar la brotación del cultivo, repitiendo cada 20 días.

FORMA DE APLICACIÓN

Agitar bien antes de usar.

Aplicación foliar utilizando equipos terrestres. Aplicación vía riego.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y seco.

Evitar contacto directo con el suelo y otros productos.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Como no es posible conocer la reactividad de todas las formulaciones existentes en el mercado, se recomienda hacer una prueba de mezcla para comprobar compatibilidad teniendo en consideración que el orden de la mezcla dependerá de los productos, sus formulaciones y pH, entre otros.

CONDICIONES DE VENTA.

1- El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.

2- Debido a que el almacenamiento, época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, éste no se responsabilizará por eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento inadecuado del producto.