

170 mm

190 mm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANSE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar almacenar el producto en temperaturas superiores a 25 °C
- No reenvasar ó depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado alejado del calor
- Conservar el producto en un envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lava la ropa contaminada, los utensilios y equipo s de aplicación y lavese con abundante agua y jabón.
- Evitar la ingestión de producto.
- Evite respirar los vapores. No inhalar la nube de aspersión.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de emergencia llamar a
CICOTOX 080013040 (gratuito)
ESSALUD 0801-10200(opción 4) 411-8000 (opción 4)

GRUPO QUIMICO: Giberelinas - Citoquininas

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y de bajo de las uñas.
- En caso de contacto de los ojos: enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos.
- En caso de inhalación trasladar al aire libre, si es necesario dar respiración artificial.
- En caso de ingestión no inducir al vomito a menos que el medico lo indique.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente
- No hay antídoto específico. El tratamiento sera sintomático.
- Diagnostico y síntomas se intoxicación el contacto directo con los ojos puede causar irritación leve



CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- No disponer ni almacenar conjuntamente con residuos municipales.
- Después de usar el contenido enjuagar tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturandolo o perforandolo y depositelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación sobrantes del producto o envase vacío.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No permitir animales en el área tratada.

CHINOIGIB

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICION

Citoquinina.....18 gr/Lt
Giberelina.....18 gr/Lt
Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. RCP N° 039- SENASA

Titular del Registro Importador y Distribuidor:



Cell.: 990 701 124
www.nutritec.biz
Jr. Santiago Crespo 421
San Luis - Lima - Perú

Fomulado por:

Nanjing Essence Fine Chemical Co., LTD.- China
9th Floor, No. 58 Nanhu Road, Nanjing, China

CONTENIDO NETO: 20 L

LOTE N°:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO :



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CHINOIGIB es un regulador de crecimiento vegetal para la aplicación foliar, que influye en la inducción floral, cuajando y crecimiento de frutos.
Se puede aplicar con diversos equipos terrestres sean móviles o estacionarios. Se recomienda que los equipos sean calibrados para conocer el gasto de agua y producto.
Antes de realizar la mezcla, acondicionar el agua limpia a un pH 5-6

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

USO ESPECIFICO Y DOSIS

Antes de realizar la mezcla acondicionar el agua limpia a un pH 5-6

CULTIVO	Momento de Aplicación	DOSIS	Periodo de Carencia (días)	L.M.R. (ppm)
ALVERJA	Al inicio de la floración y/o fructificación	Lt/Ha 0.06 - 0.1	NA	NA

NA: No aplica

LMR: Limite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- * Aplicar durante las primeras horas de la mañana cuando las condiciones climáticas aseguren buena absorción del producto humedad relativa elevada y tiempo fresco.
- Realizar un mínimo de una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas o cuando se allá secado el rocío

COMPATIBILIDAD:

- CHINOIGIB, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola y fertilizantes foliares, excepto aquellos de reacción alcalina.
- Sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en pequeñas dosis.

FITOTOXIDAD:

CHINOIGIB, No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN

