



Lesenta[®] 80WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Granulos Dispersables en Agua (WG)

Fipronil, 400 g/kg
Imidacloprid, 400 g/kg
Aditivos, csp 1kg

Reg. PQUA N° 371-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:

Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Str. 50
D-40789 Monheim am Rhein
Alemania

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**

**Contenido
Neto: 1 kg**

Lote

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada del grupo Bayer

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

“LEA LA ETIQUETA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No se debe comer, beber ni fumar durante la aplicación.
Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa, bañarse y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón.
No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, ni almacenarse en casa habitación.
Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa.
Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugares frescos y secos alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.
Durante el proceso de preparación y aplicación deberá llevar ropa protectora.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Fipronil (Fenil pirazole) Imidacloprid (Neonicotinoides).
En caso de ingestión, lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta, no administre nada a una persona inconsciente.
En caso de contaminación por piel, quite la ropa y bañe con abundante agua y jabón. Consulte a un médico si es necesario.
En caso de contaminación en los ojos, lavado ocular en agua por mínimo 15 minutos y consulte a un médico si es necesario
En caso de intoxicación por inhalación, retire al paciente a una zona ventilada fuera de la zona de contaminación, consulte a un médico si es necesario. Asistencia respiratoria artificial puede ser requerida.

INDICACIONES PARA EL MEDICO: Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

ANTIDOTO: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (OPC.4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas.
No aplicar el producto en época de floración.
No aplicar en presencia de polinizadores.
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
Considerar en el caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar lixiviación hacia aguas subterráneas.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permita animales en el área tratada.

GENERALIDADES:

LESENTA 80 WG es un insecticida que posee dos ingredientes activos Imidacloprid y Fipronil lo cual le confiere un efecto sistémico, de contacto e ingestión a nivel del sistema nervioso central de los insectos plaga.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña al año dentro de un programa de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

USO ESPECÍFICO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC* días	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TECNICO	kg / ha	%		
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.4	0.1	21	0.12
Arroz	Hydrellia	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.1	0.05	21	0.06
Papa	Premnotypes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	0.2	0.075	21	0.4 (1) 0.03 (2)

(1) LMR imidacloprid (2) LMR Fipronil
PC* = Periodo de carencia LMR** = Límite máximo de residuos

Utilizar la dosis en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila. En caso de aplicar con atomizadora de espalda a motor, emplear la dosis en kg/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

