

Acethion[®] 75 PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:

Acephate..... 750 g/kg
Aditivos csp 1 kg

Reg. PQUA N° 2670-SENASA

Formulado por :
NINGBO GENERIC
CHEMICAL CO., LTD
Room 10-6, Shidai Square,
N° 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 Kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

18.5 cm

0.8 cm

0.8 cm

18 cm

0.8 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- El producto es irritante para los ojos y la piel. Evite el contacto directo.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros), y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle una copia de esta etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, vértigo, debilidad, constricción de las pupilas, visión borrosa, excesiva salivación, sudoración, calambres abdominales, náusea y vómito.
- En caso de ingestión induzca el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dando de beber agua tibia con sal. No dar de beber leche ni productos que contengan aceites.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- En caso de inhalación, mantener al paciente al aire libre, en reposo y abrigado, hasta que llegue el médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: ANTIDOTO: Administrar sulfato de atropina. No administrar 2-PAM (PROTOPAM).

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 Op. 4, AGROKLINGES A.: (01) 641-0000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Tóxico para el ganado.

Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ACETHION75PS es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión. En aplicaciones al follaje, controla a diversas plagas que dañan a los cultivos de frijol, tomate, alfalfa, tabaco. También se usa para impregnación de semillas en algodón, frijol y maíz, protegiendo las plántulas contra gusanos de tierra y gusanos cortadores durante su primera etapa de crecimiento.

APLICACIONES FOLIARES: ACETHION75PS se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua. Realizar con cualquier equipo de aspersión terrestre en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS: Impregnación de semillas agregando el producto sobre la semilla húmeda o en una solución del producto con suficiente agua para mojar bien las semillas. El tratamiento de semilla se efectúa un día antes o el mismo día del sembrío.

CEBOS: Para la preparación de cebos usar 50g de ACETHION75PS por 50Kg de "afrecho" y 5 galones de melaza. Distribuir el preparado en el campo al atardecer.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

APLICACIONES FOLIARES

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil. 200 L		
FRIJOL	"Gusano medidor"	<i>Pseudoplusia includens</i>	1 - 1,5	400-500	3	3
TOMATE	"Gusano del fruto"	<i>Spodoptera eridania</i>	1,5	500	4	1
ALFALFA	"Oceballada"	<i>Anticarsia gemmatilis</i>	1 - 1,5	400-500	7	10
TABACO	"Gusano comigancha"	<i>Manduca sexta</i>	1 - 1,5	400-500	8	1,5

TRATAMIENTOS DE SEMILLAS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
ALGODON	"Gusano de tierra"	<i>Feltia experta</i>	5 g/kg de semilla	230g /qq de semilla	2
FRIJOL			5g / kg de semilla	----	0,5
MAÍZ	"Gusano picador"	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	5g / kg de semilla	125g / 25 kg. de semilla	2

L.M.R.=Limite máximo de residuos P.C.=Periodo de carencia

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400-600L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando aparezca la plaga. Repetir si fuera necesario, cuando se observe una re-infestación. En tratamiento de semillas, aplicar antes de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

© Marca Registrada



0.8 cm

18 cm

0.8 cm