

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y ropa.
- Causa daño temporal a los ojos.
- El contacto prolongado o repetitivo puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzoylurea
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- Teléfonos de emergencia: SAMU 106; ADAMA Agriculture Perú S.A. (01) 641-0000

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



Composición

Novaluron 100 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 Litro

Reg. PGUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro
Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60
Be'er Sheva 8410001, Israel.
Teléfono: (972) (8) 6296713

Contenido neto: **500 ml**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Rimon®

10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Reg. PGUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro
Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60
Be'er Sheva 8410001, Israel.
Teléfono: (972) (8) 6296713

Contenido neto: **500 ml**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Rimon 10 EC es un insecticida regulador del crecimiento del grupo de las benzoylurea, que actúa por ingestión sobre insectos inmaduros, principalmente estadios larvales 1 y 2, de lepidópteros inhibiendo la producción de quitina. No controla a los insectos adultos.

Rimon 10 EC se aplica por aspersión con cualquier equipo de pulverización terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas. Usar la dosis baja tan pronto se observen las primeras larvas y/o daños, usar la dosis alta cuando se tiene una presión alta de la plaga y/o las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la plaga.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Algodonero	Gusano perforador de la hoja	Bucculatrix thurberella	-	0.25 - 0.30	28	0.5
	Gusano de la hoja	Anomis texana	-	0.1		
	Gusano de la hoja	Alabarna argillacea	-	0.1		
	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	-	0.20 - 0.25		
Cal	Gusano de la Cal	Plutella xylostella	0.10 - 0.15	-	14	0.7
Frijol	Gusano de los brates	Epinotia aporema	0.10 - 0.15	-	35	0.1
	Gusano medidor	Pseudoplusia includens	0.15	-		
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.05 - 0.10	-	35	0.01
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	-	0.20 - 0.25	7	0.6
Tomate	Oruga minadora de la hoja y tallo	Scrobipalpa absoluta	0.10 - 0.15	-	7	1

P.C.: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar Rimon 10 EC hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando un intervalo entre aplicaciones de 10 días.

Realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar el momento de aplicación, la cual debe ser realizada preferiblemente sobre larvas en estadios 1 y 2.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Dimensiones: 230 mm x 120 mm

Nota: La presentación de 500 ml debe estar acompañada de la hoja informativa (folleto)