

ZOBERAMINOL® PLUS FOLIAR

Nombre comercial	ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR
Grupo	Fertilizante Foliar
Tipo	Bioestimulante
Grado	Agrícola
Comercializado por	Bioamerica® S.A.

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
L - α - aminoácidos libres	12,0	14,4
Nitrógeno total (N)	6,3	7,56
Nitrógeno orgánico (N)	6,3	7,56
Materia orgánica total	22,0	26,4
Fósforo (P ₂ O ₅)	0,5	0,6
Potasio (K ₂ O)	0,10	0,12
Hierro (Fe)	0,02	0,02
Manganeso (Mn)	0,06	0,07
Zinc (Zn)	0,06	0,07
Boro (B)	0,03	0,04

Densidad a 20°C: 1,2 g/ml
pH al 0,2 % a 20°C: 5,0

Formulación	Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción	Absorción Foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR es la formulación líquida con la mayor concentración de L - α - aminoácidos libres en el mercado, destacando aquellos que intervienen en la estimulación de la fotosíntesis, la formación de la clorofila y la superación del estrés.

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR aporta macro y micronutrientes asegurando un correcto suplemento para la nutrición y bioestimulación de las plantas. El nitrógeno presente es 100% orgánico de la más elevada calidad.



ZOBERAMINOL® PLUS FOLIAR

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	Dosis L/ha	Concentración cc/100L
Uva de Mesa Uva Vinífera Kiwi Manzanos, Nogal, Avellano Perales Carozos Paltos Cítricos Frambuesa Frutillas Arándanos	<ul style="list-style-type: none"> • Brotación • Floración y crecimiento de frutos • Post cosecha • Junto a los fitosanitarios • Antes o después de estrés 	2 - 4	150 - 200
Huertos en formación y Viveros	Cada 15 a 20 días desde inicio de brotación.	2 - 3	200 - 300
Tomate, Pepino, Pimiento, Melón, Zapallo, Sandía, Apio, Lechuga, Espinaca	<ul style="list-style-type: none"> • Almacigos • 7 días post-trasplante • Cada 10 a 12 días • Antes o después de estrés 		300
Cebolla - Ajos	<ul style="list-style-type: none"> • Desde trasplante • Desde segunda hoja cada 10 a 15 días 		
Maíz	<ul style="list-style-type: none"> • Desde estado V4 a V8 • Emisión de seda • Antes o después del estrés 		
Trigo, Avena, Cebada	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio macolla • Hoja bandera 		
Papa	<ul style="list-style-type: none"> • Desde emergencia • Inicio de tuberización, repetir cada 10 - 12 días • Aplicar antes o después del estrés 		
Otros Cultivos	<ul style="list-style-type: none"> • Antes o después del estrés • En los períodos de máximo requerimiento energético • Cuando existe mayor índice de área foliar 		

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Aplicar utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas. En aplicaciones en cítricos, paltos, cebollas, ajos y crucíferas se recomienda adicionar un surfactante. ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y fitohormonales, en el caso de ser aplicado junto con fungicidas cúpricos, se recomienda bajar la dosis. Completar el volumen deseado. Mantener con agitación constante. No aplicar en círuelos.



ZOBERAMINOL® PLUS FOLIAR

ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases: 1 - 5 - 25 L

