

BOSCAPYR®

370 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Boscalid.....250 g/Kg
Pyraclostrobin.....120 g/Kg
Aditivos.....c.s.p.1 Kg

REG. PQUA N° 2555 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED.

Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

IMPORTADOR Y **CAPEAGRO S.A.C.**
DISTRIBUIDOR: Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **250 g**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evite almacenar por encima de los 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Carboxamida + Methoxycarbaniolate.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: Llamar a CICOTOX: 0800-13040.
CIPROSQUIM: 0800-50847. ESSALUD: 411 8000 anexo 4.
CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **BOSCAPYR 370 WG** está compuesto por Pyraclostrobin que actúa sobre la cadena de respiración en la mitocondria, es epistémico (translaminar y sistémico local) y por Boscalid, que tiene acción sistémica con actividad fungicida, preventiva translaminar.
- El producto se emplea en campo, mediante método de aspersión foliar empleando equipos de aplicación terrestre como pulverizadora manual o bomba de mochila.
- Modo de preparación: Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **BOSCAPYR 370 WG**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- En el cultivo de vid, aplicar de forma preventiva y/o inicios de infección, durante las primeras horas del día o al atardecer, en la etapa de desarrollo de racimos. Realizar máximo dos (02) aplicaciones por campaña, 01 campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD

No mezcle **BOSCAPYR 370 WG** con agentes fuertemente oxidantes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.
preventiva translaminar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. común	N. Científico	(Kg/Cil)	(Kg/ha)		
Vid	"Oidiois"	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	0.75	21	A= 5 B= 2
Arándano	"Podredumbre gris / moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0.8	1	A=15 B= 4

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos (en partes por millón)

A= Boscalid

B= Pyraclostrobin

