

**LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manejo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX : 0800 - 13040; (01) 328-7398;
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE ESSALUD : 0801-10-200
CISPROQUIM: 080-050-847
ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Ver Hoja informativa adjunta

ADAMA

Exodo®

400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Pendimethalin..... 400 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1129 - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Andina B.V.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V.
Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int. Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: 500 ml

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Exodo 400 EC es un herbicida pre-emergente recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y angosta que se absorbe por las raíces y brotes. Las plántulas emergidas presentan síntomas similares a deficiencia nutricional (enrojecimiento) o de sequía debido al pobre desarrollo del sistema radicular.

Para asegurar la efectividad del control, preparar el suelo adecuadamente, libre de terrones y basura, utilizar boquillas de abanico que produzcan gotas de $\geq 400 \mu m$ y suficiente cantidad de agua (200 - 400 L/ha) para lograr un buen cubrimiento del área tratada y mantener una buena humedad de campo. La superficie tratada no debe removerse después de la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	Amar seco (<i>Bidens pilosa</i>), Yuyo (<i>Amaranthus hybridus</i>), Hierba mora (<i>Solanum nigrum</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), capulí cimarrón (<i>Nicandra physalodes</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>), Rabo de zorro (<i>Setaria verticillata</i>)	2 - 3	90	0.1
ARROZ	Amar seco (<i>Bidens pilosa</i>), Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>), Grama dulce (<i>Cynodon dactylon</i>), Malva (<i>Malvastrum coromandelianum</i>)	3.0 - 3.5	180	0.1
CEBOLLA	Amar seco (<i>Bidens pilosa</i>), Yuyo (<i>Amaranthus hybridus</i>), Hierba mora (<i>Solanum nigrum</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Malva (<i>Malvastrum coromandelianum</i>), Hierba gallinazo o paico (<i>Chenopodium ambrosioides</i>), Pega-pegá (<i>Setaria verticillata</i>)	2.5 - 3.0	110	0.1

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

Para obtener información sobre frecuencia y época de aplicación por cultivo, período de reingreso, compatibilidad y fitotoxicidad ver la Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 230 mm x 120 mm

Esta etiqueta requiere Hoja informativa adjunta