

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO* *MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS*

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Almacenar el producto en recipientes con alimentos, medicinas, bebidas o forraje.
- Usar ropa protectora para el cuerpo y la cara y aplicar y aplicar en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de 12 horas después de la aplicación, lavar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Butenolida.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentas de contacto si los hubieran y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizarlo triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros organismos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración y cuando se constatare presencia o vuelo de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios o embalses con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranos del producto.
- Retener una banda de no aplicación hacia cuencos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sáos destinados por las autoridades locales para este fin.



Sivanto
Prime

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado soluble (SL)

Composición:
Flupradfurone, 200 g/l
Aditivos, cap 1 L

Reg. PQUA N° 1537-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.

Paseo de la República 3074

Paseo 10, San Isidro.

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.

Bayer CropScience AG

Alte. Heerstrasse

41538 Dormagen

Alemania

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 1 litro

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® - Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Sivanto Prime es un insecticida de acción translaminar y sistémica constituido por el ingrediente activo Flupradfurone, perteneciente a la clase química Butenolida.
- El ingrediente activo Flupradfurone actúa ocasionando una excitación de la célula nerviosa, no pudiendo ser luchado por la acetilcolinesterasa. Esto resulta en un transloco del sistema nervioso y luego en la muerte del insecto tratado.
- Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea. Verter la mezcla al tanque del equipo y completar el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS		PC (litros)	LMP (gms)
		Nombre común	%		
Algodón	Mosca blanca	Homoptera	0.75	14	0.8
		Empoasca fabae	0.75	3	0.7
Tomate	Mosca blanca	Homoptera	0.6	7	0.01
		Empoasca fabae	0.125	1	30
Frijol	Mosca blanca	Homoptera	0.75-1	3	0.9
		Empoasca fabae	0.5	30	1
Mandarina	Mosca blanca	Homoptera	0.75-1	3	0.9
		Empoasca fabae	0.5	30	1
Pimiento	Mosca blanca	Homoptera	0.75-1	3	0.9
		Empoasca fabae	0.5	30	1
Ajo	Mosca blanca	Homoptera	0.75-1	3	0.9
		Empoasca fabae	0.5	30	1

PC = Peseo de caracida (días) LMP = Litro Litro de Flupradfurone: partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomiendan de 1 a 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año previa evaluación de la presencia de la plaga, rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla. No mezclar con fungicidas azoles.

FITOTOXICIDAD:

Sivanto Prime posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que se eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



- Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone 293 C, Pantone 286 C y Pantone 368 C