

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: strobilurin, imidazole y triazole
- No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta y hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106. ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01) 641- 0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Almagor[®] EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Azoxystrobin56 g/L
Tebuconazole100 g/L
Prochloraz200 g/L
Aditivosc.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 2591 - SENASA

Titular de Registro:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306,
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulador:
ADAMA Andina B.V.
Sucursal Colombia
Calle 1C N° 7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: 500 ml

N°. de Lote :
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



ADAMA

Importador y Distribuidor:
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254 of 306,
Santiago de Surco, Lima-Perú.
Teléfono: (01) 641-0000



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Almagor EC es un fungicida sistémico y de contacto con efectos preventivos, curativos y erradicantes que presenta una prolongada residualidad.

Agitar el envase antes de abrir y preparar la mezcla de aplicación de acuerdo con la dosis indicada en el cuadro de usos. Aplicar al follaje con equipo de pulverización terrestre, utilizando un volumen de agua que asegure una buena cobertura de las plantas. Esperar que el rocío se seque antes de realizar la aplicación para no diluir el producto y disminuir la concentración aplicada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Arroz	Pudrición de la vaina	<i>Sarocladium oryzae</i>	1.0 - 1.5	1.3 - 1.95*	35	5.0 ¹ , 1.5 ² , 2.0 ³
Cebolla	Alternariosis	<i>Alternaria porri</i>	0.2	-	21	1.0 ¹ , 0.15 ² , 0.03 ³
Maíz	Mancha negra	<i>Phyllachora maydis</i>	0.2-0.25	-	15	0.02 ¹ , 0.05 ² , 0.03 ³
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.4	-	42	7.0 ¹ , 0.02 ² , 0.03 ³

*Dosis en base a un volumen de agua máximo de 260 L/ha
P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos
1-Azoxystrobin , 2-Tebuconazole, 3-Prochloraz

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Máximo dos (02) aplicaciones por campaña en el cultivo de arroz y cebolla, con un intervalo mínimo de 14 y 15 días entre aplicaciones, respectivamente. Para el cultivo de maíz y papa considerar una (01) aplicación por campaña considerando una campaña al año. No realizar más de dos aplicaciones al año.

Momento de aplicación recomendado

Ver Hoja Informativa adjunta.

PERÍODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



Dimensiones: 120 mm x 230 mm

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA