

# CopperAdvance<sup>®</sup> 9

## FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN	
INGREDIENTES	CONTENIDO
Cobre (Cu)	9,0 % p/v
Ácidos carboxílicos	30,7 % p/v

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS	
PARÁMETRO	VALOR
Solubilidad en agua a 20 °C	> 99 %
pH	2,5
Densidad a 20 °C	1,340 g/L

Metales pesados: Pb < 20,0 ppm; As < 20,0 ppm; Cd < 2,0 ppm; Hg < 2,0 ppm

DOSIS Y APLICACIÓN			
CULTIVO	DOSIS/100 L	DOSIS/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Arándanos y berries	100 cc	1,0 L	Inicio de floración, repetir cada 10 días
Avellano europeo	100 cc	1,5 L	Inicio de brotación, repetir cada 10 días
Carozos	100 cc	1,5 L	Desde yema hinchada, repetir cada 10 días
Cerezo	100 cc	1,5 L	Desde yema hinchada, repetir cada 10 días
Cítricos	100 cc	1,0 L	Inicio de brotación, repetir cada 10 días
Hortalizas en general	100 cc	1,0 L	A partir de hojas verdaderas, repetir cada 7 días
Kiwi	100 cc	1,5 L	Inicio de brotación, repetir cada 10 días
Nogal	100 cc	1,5 L	Inicio de brotación, repetir cada 10 días
Olivos	50 cc	1,5 L	Desde yema hinchada, repetir cada 10 días
Palto	100 cc	1,5 L	Inicio de crecimiento vegetativo, repetir cada 10 días
Papas	100 cc	1,5 L	20 días post emergencia, repetir cada 15 días
Pomáceas	100 cc	1,0 L	A partir de inicio de floración, repetir cada 10 días
Tomate, pimentón, ají	100 cc	1,0 L	15 días post trasplante, repetir a los 15 días
Vid de mesa	100 cc	1,0 L	Brotos de 5 cm, repetir cada 10 días
Vid Vinífera	100 cc	1,0 L	Brotos de 5 cm, repetir cada 10 días
Viveros frutales	100 cc	-	-

**Advertencia:** Lea cuidadosamente la etiqueta y la ficha técnica del producto previo a su uso. El uso adecuado del producto y de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y la ficha técnica no debiese afectar negativamente el crecimiento vegetativo-reproductivo normal, en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, diversos factores medioambientales y agronómicos, como el estrés de los cultivos asociados a las altas y bajas temperaturas y/o condiciones secas o excesiva humedad, hacen que sea imposible eliminar todos los riesgos asociados al uso del producto, por lo que el daño al cultivo siempre es posible. Atendida la diversidad de factores que pueden incidir en el cultivo, el cliente siempre deberá aplicar el producto siguiendo las recomendaciones de una institución o persona calificada, tales como pero no limitado a, asesores de cultivos certificados, ingenieros agrónomos o recomendaciones aprobadas en el plan de manejo de nutrientes. En caso de dudas, consulte previamente a su representante del Distribuidor del producto. El cliente es responsable de la conservación, manipulación y utilización adecuada del producto. El incumplimiento de las instrucciones de conservación, manipulación, utilización y, en general, toda aquella información contenida en la etiqueta y ficha técnica del producto, pueden causar daños a los cultivos, animales, el hombre o el medioambiente, no siendo de responsabilidad de Agroadvance® SpA o el vendedor las consecuencias del uso inadecuado del producto en las condiciones señaladas.

**Fertilizante foliar en base a sulfato de cobre pentahidratado complejo con gluconato y ácido cítrico.**

**Recomendaciones de uso:**

- Llene el equipo pulverizador con agua a 2/3 de su capacidad.
- Agite y disuelva el producto CopperAdvance® 9.
- Complete con agua al volumen requerido. Una vez preparada la solución aplique inmediatamente al cultivo.
- Aplique con un volumen suficiente de agua que permita asperjar copa y frutos, idealmente con nebulizador.
- Evite las horas de temperaturas extremas (bajo 2 °C o sobre los 25 °C) y/o días con humedad relativa alta o donde ha ocurrido helada, por la sensibilidad de la epidermis del fruto.
- No olvide tomar las debidas medidas de seguridad para cada aplicación foliar.
- **Duración:** Por un periodo de 24 meses, a partir de la fecha de elaboración. Conservar en un ambiente fresco y seco hasta su uso. Una vez abierto, es necesario utilizar el producto en su totalidad dentro de las primeras 72 hrs. No almacenar los remanentes.

**Precauciones:** CopperAdvance® 9 no es un producto peligroso pero en contacto con la piel, ingestión o contacto ocular puede provocar efectos nocivos o irritación. Para mayor información consultar hoja de datos de seguridad del producto. En cualquier caso, de intoxicación o efectos adversos, consultar a un médico o contactar a Corporación RITA +562 2777 1994.

**Compatibilidad:** No mezclar con productos de reacción alcalina, emulsiones concentradas, derivados cúpricos y aceites minerales o vegetales. Se recomienda previamente realizar pruebas de reactividad antes de su aplicación. En caso de aplicarlo con productos diferentes a los señalados, consultar previamente su compatibilidad con un asesor experto o al representante del Distribuidor del producto.

**Fitotoxicidad:** No presenta, si se aplica según recomendación de la etiqueta y ficha técnica.



No use el producto en forma diferente a lo indicado en esta etiqueta y la ficha técnica.



**AGRO  
ADVANCE<sup>®</sup>**  
BIOTECNOLOGÍA

Producto fabricado por **Agroadvance SpA**.  
Camino Melipilla 26.200, Peñaflor.  
Fono: +56 2 270 85 377 | [www.agroadvance.cl](http://www.agroadvance.cl)

