FICHA TÉCNICA

CHEMIE® Innovación Agroveterinaria

REPELENTES

ABSORCIÓN FOLIAR & RADICAL

Línea ORGÁNICA

Nombre Comercial:	Biodynamics® BIRD PRO
Ingrediente Activo:	Hecho a base de roble, ortiga, diente de león, alcohol. Orgánico
Tipo:	No indicado
Concentración:	Líquido
Formulación	-
Densidad:	-
pH:	-
Solubilidad en agua:	Absorción foliar y radical
Modo de Acción:	CHEMIE® S.A.
Proveedor:	No corresponde
Autorización SAG:	
Carácteristicas:	**BIRD PRO** es un Bioestimulante hecho a partir de preparados biodinámicos, extractos vegetales y compuestos orgánicos. **BIRD PRO** está recomendado para la agricultura orgánica y convencional. Uso válido para todo tipo de hortalizas y frutales. **BIRD PRO** tiene un efecto balanceador del complejo suelo - planta, fortaleciéndola frente al ataque de agentes externos. **BIRD PRO** no deja residuos en los cultivos. No tiene días de carencia, no tiene riesgo para la aplicación ni consumo. **BIRD PRO** está hecho a base de roble, ortiga, diente de león y alcohol. Almacénese en un lugar fresco, seco y oscuro. Mantener fuera del alcance de los niños, no ingerir.
Compatibilidad:	No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivelde campo.
Fitotoxicidad:	No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

Aplicaciones:

Cultivo	Dosis (L/ha)	Momento de Aplicación y Observaciones
Uva de mesa y Uva vinífera	0,250 (250 mL/ha)	1° aplicación: 5 - 7 días antes de inicio de pinta 2° aplicación: Inicio de pinta 3° aplicación: 5 - 10 días después de la 2° aplicación 4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación 5° aplicación: En caso de requerir extender el periodo de protección
Cerezo	0,250 (250 mL/ha)	1° aplicación: Aplicar 7 días antes de amarillo pajizo 2° aplicación: 5 – 7 días después de la 1° aplicación 3° aplicación: 7 - 10 días después de la 2° aplicación 4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación
Carozos, pomáceas, Frutos de hueso	0,250 (250 mL/ha)	1° aplicación: 5 - 7 días antes de inicio de inicio de madurez 2° aplicación: Inicio de pinta 3° aplicación: 7 - 10 días después de la 2° aplicación 4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación
Arándanos	0,250 (250 mL/ha)	1° aplicación: Aplicar 7 días antes de amarillo pajizo 2° aplicación: 5 – 7 días después de la 1° aplicación 3° aplicación: 7 - 10 días después de la 2° aplicación 4° aplicación: 7 - 10 días después de la 3° aplicación

Precauciones: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.