

BRASS PREMIUM

Bioestimulante con Brasinoesteroides

BIOESTIMULANTE
ORGÁNICO

PROMOTOR NATURAL DE CRECIMIENTO

BRASS PREMIUM

ASCOPHYLLUM NODOSUM + EXTRACTO VEGETAL

BRASINOESTEROIDES

Uso exclusivo foliar

Sin hormonas sintéticas

Cuaje y maduración

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BRASS PREMIUM es un bioestimulante que fusiona la acción de un extracto de *ascophyllum nodosum* con una base de extracto natural rico en potenciadores del metabolismo de la planta. **BRASS PREMIUM** potencia la división celular, aumenta la cuaja de frutos y uniformiza el calibre de los frutos, dando una condición ideal en acumulación de sólidos solubles y firmeza que mejora la vida útil postcosecha del fruto. Por su formulación, todos sus componentes son de origen natural.

BENEFICIOS CLAVE



MAYOR NÚMERO
DE FRUTOS



HOMOGENEIZACIÓN
DE CALIBRE



MEJORA
DE COLOR



FIRMEZA Y VIDA
POSTCOSECHA



BRASS PREMIUM NO incluye ningún componente hormonal sintético y/o adición de cualquier otra sustancia externa a la extracción realizada a las diferentes especies vegetales.

COMPOSICIÓN

COMPONENTE	CONCENTRACIÓN
Materia Orgánica	7,32 %

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

7,75 PH	1,060 DENSIDAD g/cc
------------	------------------------

MODO DE EMPLEO

BRASS PREMIUM es un producto que se debe de emplear exclusivamente vía foliar, dado que necesitamos actuar rápidamente en los órganos que queremos acelerar.

VÍA FOLIAR

150-300 cc/100L

Intervalo de aplicación 7-10 días cuando haya que hacer repetición.

APLICACIONES ESPECÍFICAS

CULTIVO	MOMENTO	DOSIS
Cerezo	Floración – Cuaje	150-300 cc/100L
	Mejora condición – Inicio viraje color	300 cc/100L
Cítricos, Palta	Brotación – Cuaje	200 cc/100L
	Engorde de frutos	200-300 cc/100L
Frutales de hueso	Floración – Cuaje	200 cc/100L
Uva mesa	Cierre de racimo (mejora de firmeza)	3 L/Ha

Realizar al menos 2 aplicaciones en la fase de Floración-Cuaje en cerezo. Si la primavera es fría o con lluvias se realizarán 3 aplicaciones en esta etapa. En cítricos y palta, en función del número de frutos usaremos una dosis u otra: a más frutos, mayor dosis. En frutales de hueso, misma dosis durante desarrollo de fruto, realizando al menos 2 aplicaciones durante esta fase.

OBSERVACIONES



Aviso de responsabilidad: las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapen a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El usuario será responsable de los daños causados por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.