

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Reg. PQUA N° 614 - SENASA

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd
P.O. Box 60, Industrial Zone
Be'er Sheva 8410001. Israel.

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, posible CARCINOGENO.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar las gotas de aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lávela la ropa contaminada.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado en un lugar fresco.

- Grupo químico: Clorántrilol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos. Acuda a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia. Llame a un médico.
- Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Odeon 720 SC es un fungicida preventivo con acción de contacto que inhibe la respiración celular en los hongos previniendo el desarrollo de un amplio rango de enfermedades.

Realizar la aplicación con gatos finas y cobertura uniforme. Se recomienda utilizar boquillas de cono hueco.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
Cebolla	Mildiu (<i>Peronospora destructor</i>)	0.35	7	1.5
Espárrago	Mancha de peral (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	0.6 - 0.8	30	1
Papa	Rancha (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.3 - 0.5	7	0.3

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar de forma preventiva cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo del hongo o al inicio de la enfermedad.
Número máximo de aplicaciones por campaña: 3.
Intervalo mínimo entre aplicaciones: 10 días.

Cebolla.- Desde el transplante hasta antes de la cosecha (hojas dobladas y secas).

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura, a excepción de aceites y materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar un prueba de compatibilidad física.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CARA

CONTRACARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm (por cara)

Nota: Esta etiqueta debe ir acompañada de la Hoja Informativa