

BC-1000[®] Dust

EXTRACTO VEGETAL FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Seco (DP)

Composición:

Extracto de semilla + pulpa de toronja 14.7 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

PBUA N° 187 - SENASA

Titular de Registro: CHEMIE[®] S. A.
Av. Tomas Ramsey Nro. 930 Oficina 905
Magdalena del Mar, Lima 17 - Perú.
Teléfono: (51-1) 4937980

Formulador: CHEMIE[®] S. A.
San Ignacio 401-B, Quilicura, Santiago, Chile


Innovación Agroveterinaria
Importador y Distribuidor: CHEMIE[®] S. A.
Av. Tomas Ramsey Nro. 930 Oficina 905
Magdalena del Mar, Lima 17 - Perú.
Teléfono: (51-1) 4937980

Contenido Neto : **18 Kg**

N° de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

BC-1000® Dust es un producto de baja toxicidad, no corrosivo, no volátil, no explosivo, no irritante, inodoro. Sin embargo, se recomienda lo siguiente:

- Protejase los ojos al momento de aplicarlo.
- No comer, beber o fumar durante el uso del producto.
- Durante la aplicación usar equipo de protección como botas, guantes, pechera, protector facial, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco, fresco y exclusivo para productos fitosanitarios.
- No reutilice los envases vacíos.

PRIMEROS AUXILIOS:

Los síntomas de intoxicación son dolor de cabeza y malestar general.

Si el contacto es por vía dermal: Se debe remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón neutro la zona afectada, incluyendo pelo y uñas.

Si el contacto es por vía ocular: Quitar lentes de contacto, ya sean ópticos o de contacto y luego mantener los párpados abiertos para lavar con abundante agua por al menos 15 minutos.

Si el contacto es por vía oral: No inducir vómito, en primera instancia dirigirse al Servicio de Salud más cercano o consultar a un centro de información Toxicológica.

Si el contacto es por inhalación: Trasladar al paciente al aire libre, lejos del área contaminada y dejar en reposo. Conseguir atención médica y si se hace dificultosa la respiración dar oxígeno y ventilación.

En caso de intoxicación: mostrar la etiqueta, el folleto o el envase al personal de salud.

NOTA AL MÉDICO:

No inducir al vómito, administrar carbón activado (o medicinal), diluidos en 4 partes de agua tibia hasta obtener consistencia de sopa espesa.

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
- Los envases inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades.
- No transportar ni almacenar con alimentos.
- No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- **BC-1000® Dust** es un producto natural de baja toxicidad a organismos acuáticos, aves y abejas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BC-1000® Dust es un fungicida natural de amplio espectro, cuyos ingredientes activos provienen de extractos de cítricos y actúa alterando la membrana celular e inhibiendo la respiración celular. También estimula el sistema de defensa de las plantas promoviendo la síntesis de fitoalexinas.

Tiene una probada eficacia en el control de Pudrición gris causada por *Botrytis cinerea* y Pudrición ácida causada por un complejo de microorganismo como hongos, bacterias y levaduras en los racimos de la vid.

BC-1000® Dust está exento de tolerancias y por lo tanto no debe de cumplir con un período de carencia a la cosecha. Posee un marcado efecto residual que está en función de la presión del patógeno así como de las condiciones medioambientales.

BC-1000® Dust posee una formulación homogénea de ingredientes activos e inertes con un adecuado tamaño de partículas y fluidez que facilitan su manipulación y aplicación. **BC-1000® Dust** es un producto que puede ser vertido directamente a las espolvoreadoras para su aplicación.

La aplicación se efectúa mediante espolvoreadoras directamente sobre el área deseada.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones pueden realizarse desde plena floración hasta cosecha de forma preventiva ante la presencia de condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad o curativa ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda el uso de **BC-1000® DUST** en tratamientos preventivos y curativos con intervalos de 7 y 10 días.

PERIODO DE REINGRESO:

No existe restricción en cuanto al tiempo que deba mediar entre la aplicación e ingreso de personas animales al campo tratado, siembra o plantación del cultivo siguiente, ni los frigoríficos, cámaras u otros medios de almacenamiento, pues el producto no deja residuos por ser todos sus componentes de origen natural, sin embargo se recomienda esperar 4 horas.

COMPATIBILIDAD:

Por tipo de formulación, el producto es compatible con azufre. Para otras mezclas de productos de formulación polvo se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No se tienen reportes de toxicidad en plantas y no se presentan de seguir las recomendaciones de la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Enfermedad		Dosis kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
VID	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	20 - 23	0	NA
	Pudrición ácida	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Penicillium expansum</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Cladosporium herbarum</i>	20 - 23	0	NA
PALTOS	Moho negro	<i>Cladosporium sp</i>	18	0	NA
MANDARINO	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	18	0	NA

PC : Período de carencia
LMR : Límite máximo de residuos
NA : No aplica

Se recomienda el uso de **BC-1000® Dust** dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad que incluya, prácticas culturales y rotación de fungicidas de distinto modo de acción y diferente composición, para evitar la aparición de cepas resistentes.

