FERTILIZANTE LÍQUIDO
APLICACIÓN FOLIAR

Keylate®
MOLIBDENO

Stoller

- Suple las deficiencias de Molibdeno.
- Acelera la metobolización del Nitrógeno.
- Promueve la síntesis de aminoácidos.
- Favorece la entrada a receso en frutales de hoja caduca.

CULTIVO	DOSIS	APLICACIÓN
Duraznero, Nectarines, Manzano, Peral, Kiwi, Nogal, Almendro, Ciruelo, Damasco, Uva de Mesa y Viñas	0,4 - 0,6 L/ha	Aplicar desde la primera quincena de abril, cuando las temperaturas comiencen a disminuir y se acorte el fotoperíodo, cuando se den las primeras señales de freno de actividad. En caso de buscar frenar el exceso de desarrollo vegetativo, se recomienda realizar aplicaciones tempranas (brotes de 5 cm) para disminuir el exceso de crecimiento. Se recomienda aplicar máximo 3 veces para dicho fin.
Arándano	0,35 - 0,5 L/ha	Aplicar desde la primera quincena de abril, cuando las temperaturas comiencen a disminuir y se acorte el fotoperíodo, cuando se den las primeras señales de freno de actividad.
Cerezo	0,6 L/ha	Aplicar desde la primera quincena de abril, cuando las temperaturas comiencen a disminuir y se acorte el fotoperíodo, cuando se den las primeras señales de freno de actividad.
Avellano Europeo	0,4 - 0,6 L/ha	Aplicar después de cosecha para inducir receso invernal y aumentar reservas.
Plantaciones nuevas y viveros	10 - 15 cc/100 L Agua	Aplicar desde la primera quincena de abril, cuando las temperaturas comiencen a disminuir y se acorte el fotoperíodo, cuando se den las primeras señales de freno de actividad.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Molibdeno (Mo)	7%

Acomplejado con aminas primarias y ácidos carboxílicos.
(Valores expresados en % peso/volumen)

pH	10,5
Densidad (g/L)	1180 g/L a 20°C
Solubilidad (%)	100% a 20C

METALES PESADOS (mg/kg)

Arsénico	17,4
Plomo	0,05
Cadmio	0,02
Mercurio	0,02

ND. No detectado.
Limite establecido analítico 0,5 mg/kg

CONDICIONES DE VENTA

1.- El vendedor garantiza exclusivamente que este producto contiene los ingredientes especificados en la etiqueta.
2.- Debido a que el almacenamiento, época, lugar y dosis de la aplicación están fuera del control del vendedor, éste no se responsabilizará por eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento inadecuado del producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Se recomienda hacer una prueba de mezcla para comprobar compatibilidad. Cuando lo utilice como parte de un programa nutricional y/o protección siga este orden de mezcla:
1.- Agua 2.- KEYLATE MOLIBDENO® 3.- Agroquímico

ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y seco. Evitar contacto directo con el suelo y otros productos.

AGITESE ANTES DE USAR

Stoller
Activando el poder de las plantas

WWW.STOLLER.CL

Para consultas técnicas contactarse con el Ing.Agrónomo de Stoller en su zona o con el departamento Técnico de Stoller de Chile S.p.A.

Ruta 5 Sur, Km 192, Curicó. Chile.
Teléfono +56 (75) 2314789
dtecnico@stoller.cl

Fabricado por STOLLER DE CHILE S.p.A.
Bajo la licencia de STOLLER ENTERPRISES INC.
® Marca Registrada de Stoller de Chile S.p.A.

BALANCE HORMONAL
NUTRICIÓN VEGETAL
EXPRESIÓN GENÉTICA