



Teldor® 50 PM

“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

“Después de usar el contenido de la caja, inutilícelas rompiéndola o perforándola y depositela en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. En caso de derrames recoger cuidadosamente el producto sin formar nubes de polvo al barrer, luego lavar la zona afectada con agua, disponer el producto en envases herméticos”.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

“Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Peligroso a peces, no contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos y envases vacíos.
Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos”.



Teldor® 50 PM

“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:
“Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos”.
“Utilizar protección ocular hermética durante el manipuleo y aplicación”.
“Evitar la inhalación y contacto con la piel usando equipo y ropa protectora”.
“Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación”.
“No desatorar las boquillas soplando con la boca”.
“No comer ni fumar durante la aplicación”.
“No verter los restos del caldo de aspersión sobre vegetación útil y fuentes de agua (lagos, ríos, estanques y acequias)”.
“Usarlo en sus envases originales y almacenarlo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados”.
“Transportarlo y almacenarlo en sus envases originales debidamente etiquetados y bien cerrados”.
“Mantenerlo lejos del alcance de los niños y animales domésticos”.
“No almacenar ni transportar junto con productos alimenticios, bebidas, forrajes y medicinas”.
“Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminado y báñese con abundante agua y jabón” .

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Hidroxyanilidas
Retirar las prendas contaminadas y lavar la piel con abundante agua y jabón.
Mantener al paciente abrigado en un lugar adecuado. En caso de ingestión oral, dar de beber 1 ó 2 vasos de agua e inducir al vómito, sólo si el paciente está conciente. En cosa de contacto con los ojos lavar con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático.

Antídoto: No existe un antídoto específico.

Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación:
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROMQUIM: 0800-50847



Teldor® 50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)
Composición
Fenhexamid 500 g/kg
Aditivos,csp 1kg
Reg.: PQUA 004-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San isidro.

Formulado por:
Bayer S.A
Av. Américas 57-52
Bogotá DC
Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 5 kg

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Teldor® 50 PM

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INFORMACIÓN GENERAL:

Teldor 50 PM es un fungicida preventivo perteneciente al grupo de las hidroxyanilidas. Empleado para el control de Botrytis en vid y alcachofa. Debido a su nuevo modo de acción no presenta problemas de resistencia. Inocuo para enemigos naturales y abejas.

INDICACIONES DE USO:

Se aplica en espolvoreo en mezcla con azufre en polvo (25kg/ha). Es recomendable preparar previamente una mezcla bien uniforme.

USO ESPECIFICO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	Kg/ha	%		
Vid	Botrytis	Botrytis cinerea	1.2-1.5	--	3	5
Alcachofa	Botrytis	Botrytis cinerea	0.75	--	10	0.05
Arandanos	Botrytis	Botrytis cinerea	--	0.125	3	5

*PC=Periodo de carencia (días) LMR=Límite Máximo de Residuos (partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En el cultivo de vid, se recomienda hacer aplicaciones de Teldor 50 PM en los siguientes momentos de desarrollo del cultivo: cierre de racimos, envero y pre-cosecha. En el cultivo de arándanos, se recomienda realizar la aplicación de manera oportuna al inicio de la floración.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones de uso.
Aplicar las dosis alta cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y se maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

