

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Almagor[®] EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Azoxystrobin 56 g/L
Tebuconazole 100 g/L
Prochloraz 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 2591-SENASA

Titular de Registro:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulador:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N° 7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

CONTENIDO NETO: 20 Litros

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CARA

Dimensiones: 184 mm x 190 mm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Estrobilurina + Imidazole + Triazole
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106. ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01) 641- 0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napa freática superficial o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Almagor EC es un fungicida sistémico y de contacto con efectos preventivos, curativos y erradicantes que presenta una prolongada residualidad.

Agitar el envase antes de abrir y preparar la mezcla de aplicación de acuerdo con la dosis indicada en el cuadro de usos. Aplicar al follaje con equipo de pulverización terrestre utilizando un volumen de agua que asegure una buena cobertura de las plantas. Esperar que el rocío se seque antes de realizar la aplicación para no diluir el producto y disminuir la concentración aplicada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Arroz	Pudrición de la vaina	<i>Sarocladium oryzae</i>	1.0 - 1.5	1.3 - 1.95*	35	5.0 ¹ , 1.5 ² , 2.0 ³
Cebolla	Alternariosis	<i>Alternaria porri</i>	0.2	-	21	1.0 ¹ , 0.15 ² , 0.03 ³
Maíz	Mancha negra	<i>Phyllachora maydis</i>	0.2-0.25	-	15	0.02 ¹ , 0.05 ² , 0.03 ³
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.4	-	42	7.0 ¹ , 0.02 ² , 0.03 ³

*Dosis en base a un volumen de agua máximo de 260 L/ha

P.C.: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos

1-Azoxystrobin, 2-Tebuconazole, 3-Prochloraz

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Máximo dos (02) aplicaciones por campaña en el cultivo de arroz y cebolla, con un intervalo mínimo de 14 y 15 días entre aplicaciones, respectivamente. Para el cultivo de maíz y papa considerar una (01) aplicación por campaña considerando una campaña al año. No realizar más de dos aplicaciones al año.

Momento de aplicación recomendado

- Arroz: Aplicar entre macollamiento y punto de algodón.
- Cebolla: Aplicar en crecimiento vegetativo hasta bulbeo.
- Maíz: Desde la aparición de los primeros síntomas a partir 35 días (después del aporque en pleno desarrollo vegetativo) hasta la etapa de inicios de floración.

- Papa: Realizar la aplicación al momento de la siembra. Realizar la primera aplicación cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la misma.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se conoce incompatibilidad específica. Evitar mezclar con productos de reacción alcalina o ácida.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”



CONTRACARA