

**LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No desatorar las boquillas soplando con la boca.
- No utilizar este envase para conservar alimentos o agua potable.
- Almacenar este producto bajo techo, en un lugar fresco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Tetrizina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa.
- Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CISPROQUIM: 0800-050-847; CICOTOX: 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Acaristop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Clofentezine 500 g/l
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX- SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Peru S.A.

Av. El Derby N° 254 Of. 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:

SAFAPAC Ltd
4 Stapledon Road, Orton Southgate,
Peterborough- Reino Unido
para:
ADAMA Irvita N.V.

Contenido neto: **500 ml**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Acaristop es un acaricida de contacto que actúa durante las fases embrionarias (huevos) finales y el desarrollo larvario temprano, por lo que debe aplicarse en infestaciones muy tempranas, cuando se observan los primeros huevos en las hojas. **Acaristop** no actúa sobre ácaros adultos.

Utilizar altos volúmenes de agua de tal forma que la aplicación sea uniforme, cubrir completamente el follaje (sin llegar al punto de escurrimiento) especialmente en el envés de las hojas que es el sitio preferido por los ácaros. Utilizar las dosis altas cuando se tenga más del 30% de plantas infestadas.

Acaristop mezclado con aceite agrícola en dosis bajas (200 ml de aceite en 100 litros de agua) logra un buen control tanto de adultos como huevos, si las infestaciones son iniciales.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (mL/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Melón	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.02
Sandia	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.02
Zapallo	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.02
Duraznero	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	60 - 80	28	0.2
Espárrago	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.02
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	28	2.0
	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	80	28	0.5
Mandarina	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	60 - 80	28	0.5
Manzano	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	60 - 80	28	0.5
Naranja	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	60 - 80	28	0.5
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	60	24	0.3
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	28	1.0

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos N.D.: No determinado.

Ver otras recomendaciones de uso aprobadas para **ACARISTOP** en la hoja informativa adjunta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Máximo una (1) aplicación por campaña y año.
Realizar la aplicación cuando se observen las primeras posturas de huevos (menos de 5 por hoja).

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Dimensiones: 230 mm x 120 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa