

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **FUNGISEI®** es un biofungicida que actúa previniendo y controlando enfermedades fúngicas y bacterianas en plantas.
- La cepa patentada de *Bacillus subtilis* contenida en **FUNGISEI®** produce un grupo de lipopéptidos de amplio espectro que controlan hongos y bacterias. Su modo de acción se basa en la interrupción de la pared celular provocando la rotura de la membrana celular de los patógenos. Así mismo evita la germinación de las esporas previniendo la instalación del patógeno y destruye el tubo germinativo. Por otro lado, **FUNGISEI®** tiene un efecto como inductor de defensas creando una resistencia sistémica de la planta a la enfermedad (Resistencia Sistémica Inducida), promoviendo los mecanismos de defensa natural de la planta durante prolongados periodos de tiempo.

- **FUNGISEI®**, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores y por inyección al sistema de riego. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

- **FUNGISEI®** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, verter la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. No permitir que la mezcla se quede realizada sin utilizar durante un largo periodo de tiempo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
- Se recomienda un máximo de 5 aplicaciones alternadas por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 7 a 10 días. Se recomienda rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 4 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD

FUNGISEI® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

FUNGISEI® no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere de mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Fungisei®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Bacillus subtilis (Cepa IAB/BS03).....1x10⁸ UFC/ml
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° 006-SENASA-PBA-ACBM

Titular de Registro:

L&M SERVICIOS AGRÍCOLAS INTEGRALES SAC

Av. Javier Prado Este 488 Piso 9, San Isidro. Lima, Perú.

Teléfono: (01) 382-4874

Formulado por: **SEIPASA S.A.**

C/ Almedívar N° 2

22240 Tardienta, Huesca - España

Tel.: +34 962 541 163



Importado y distribuido por: **POINT ANDINA S.A.**

Calle Los Tulipanes 147, Oficina 701-B

Santiago de Surco, Lima - Perú

Tel. +51 (01) 348-1018 / 349-9609



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Usar overol, botas, guantes resistentes a químicos, mascarilla, protector de ojos y rostro contra salpicaduras.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso del contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 10 minutos.
- En caso del contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con jabón y abundante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.

- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene aplique respiración artificial.

- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

AGRILAB: 3638659

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

Fórmula empírica: No aplica

Peso molecular: No aplica

Propiedades físicas y químicas:

- **Aspecto:** líquido homogéneo

- **Color:** Ligeramente amarillo

- **Olor:** característico

- **pH:** 7.23

- **Densidad relativa:** 1.24 g/ml

- **Persistencia de espuma:** 1 ml (1 min)

- **Viscosidad:** 368.5 cP

Capacidad y clase de los envases:

Botellas PEAD 500 mL, 1 L, 5L, 10 L, 20 L y 20 L

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- No mezclar con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia / LMR: Límite máximo de residuos / N.A.: No aplica.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Usar overol, botas, guantes resistentes a químicos, mascarilla, protector de ojos y rostro contra salpicaduras.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso del contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 10 minutos.
- En caso del contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con jabón y abundante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene aplique respiración artificial.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

Tel. del titular: AGRILAB: (01)363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Fungisei®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Bacillus subtilis (Cepa IAB/BS03).....1x10⁸ UFC/ml
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° 006-SENASA-PBA-ACBM

Titular de Registro: L&M SERVICIOS AGRÍCOLAS
INTEGRALES SAC
Av. Javier Prado Este 488 Piso 9,
San Isidro, Lima, Perú
Teléfono: (01) 382-4874

Formulado por:

SEIPASA S.A.
C/ Almudévar N° 2
22240 Tardienta, Huesca - España
Tel.: +34 962 541 163

Importado y distribuido por:

POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147, Oficina 701-B
Santiago de Surco, Lima - Perú
Tel. +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Contenido Neto: 1L

N° de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **FUNGISEI®** es un biofungicida que actúa previniendo y controlando enfermedades fúngicas y bacterianas en plantas. La cepa patentada de *Bacillus subtilis* contenida en **FUNGISEI®** produce un grupo de lipopéptidos de amplio espectro que controlan hongos y bacterias.
- Su modo de acción se basa en la interrupción de la pared celular provocando la rotura de la membrana celular de los patógenos. Así mismo evita la germinación de las esporas previniendo la instalación del patógeno y destruye el tubo germinativo. Por otro lado, **FUNGISEI®** tiene un efecto como inductor de defensas creando una resistencia sistémica de la planta a la enfermedad (Resistencia Sistémica Inducida), promoviendo los mecanismos de defensa natural de la planta durante prolongados períodos de tiempo.
- **FUNGISEI®**, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores y por inyección al sistema de riego. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- **FUNGISEI®** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.
- Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. No permitir que la mezcla se quede realizada sin utilizar durante un largo periodo de tiempo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia / LMR: Límite máximo de residuos / N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
- Se recomienda un máximo de 5 aplicaciones alternadas por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 7 a 10 días. Se recomienda rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 4 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD

FUNGISEI® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

FUNGISEI® no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Si requiere de mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Usar overol, botas, guantes resistentes a químicos, mascarilla, protector de ojos y rostro contra salpicaduras.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso del contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 10 minutos.
- En caso del contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con jabón y abundante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene aplique respiración artificial.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

Tel. del titular: AGRILAB: (01)363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Fungisei®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Bacillus subtilis (Cepa IAB/BS03).....1x10⁸ UFC/ml
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° 006-SENASA-PBA-ACBM

Titular de Registro: L&M SERVICIOS AGRÍCOLAS
INTEGRALES SAC
Av. Javier Prado Este 488 Piso 9,
San Isidro. Lima, Perú
Teléfono: (01) 382-4874

Formulado por:

SEIPASA S.A.
C/ Almudévar N° 2
22240 Tardienta, Huesca - España
Tel.: +34 962 541 163

seipasa®

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147, Oficina 701-B
Santiago de Surco, Lima - Perú
Tel. +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Contenido Neto: 5L

N° de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **FUNGISEI®** es un biofungicida que actúa previniendo y controlando enfermedades fúngicas y bacterianas en plantas. La cepa patentada de *Bacillus subtilis* contenida en **FUNGISEI®** produce un grupo de lipopéptidos de amplio espectro que controlan hongos y bacterias.
- Su modo de acción se basa en la interrupción de la pared celular provocando la rotura de la membrana celular de los patógenos. Así mismo evita la germinación de las esporas previniendo la instalación del patógeno y destruye el tubo germinativo. Por otro lado, **FUNGISEI®** tiene un efecto como inductor de defensas creando una resistencia sistémica de la planta a la enfermedad (Resistencia Sistémica Inducida), promoviendo los mecanismos de defensa natural de la planta durante prolongados períodos de tiempo.
- **FUNGISEI®**, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores y por inyección al sistema de riego. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- **FUNGISEI®** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.
- Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. No permitir que la mezcla se quede realizada sin utilizar durante un largo periodo de tiempo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia / LMR: Límite máximo de residuos / N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
- Se recomienda un máximo de 5 aplicaciones alternadas por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 7 a 10 días. Se recomienda rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 4 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD

FUNGISEI® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

FUNGISEI® no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere de mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Usar overol, botas, guantes resistentes a químicos, mascarilla, protector de ojos y rostro contra salpicaduras.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso del contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 10 minutos.
- En caso del contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con jabón y abundante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene aplique respiración artificial.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

Tel. del titular: AGRILAB: (01)363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Fungisei®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Bacillus subtilis (Cepa IAB/BS03).....1x10⁸ UFC/ml
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° 006-SENASA-PBA-ACBM

Titular de Registro: L&M SERVICIOS AGRÍCOLAS
INTEGRALES SAC
Av. Javier Prado Este 488 Piso 9,
San Isidro. Lima, Perú
Teléfono: (01) 382-4874

Formulado por:

SEIPASA S.A.
C/ Almudévar N° 2
22240 Tardienta, Huesca - España
Tel.: +34 962 541 163

seipasa®

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147, Oficina 701-B
Santiago de Surco, Lima - Perú
Tel. +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Contenido Neto: 10L

N° de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **FUNGISEI®** es un biofungicida que actúa previniendo y controlando enfermedades fúngicas y bacterianas en plantas. La cepa patentada de *Bacillus subtilis* contenida en **FUNGISEI®** produce un grupo de lipopéptidos de amplio espectro que controlan hongos y bacterias.
- Su modo de acción se basa en la interrupción de la pared celular provocando la rotura de la membrana celular de los patógenos. Así mismo evita la germinación de las esporas previniendo la instalación del patógeno y destruye el tubo germinativo. Por otro lado, **FUNGISEI®** tiene un efecto como inductor de defensas creando una resistencia sistémica de la planta a la enfermedad (Resistencia Sistémica Inducida), promoviendo los mecanismos de defensa natural de la planta durante prolongados períodos de tiempo.
- **FUNGISEI®**, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores y por inyección al sistema de riego. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- **FUNGISEI®** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.
- Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. No permitir que la mezcla se quede realizada sin utilizar durante un largo periodo de tiempo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia / LMR: Límite máximo de residuos / N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
- Se recomienda un máximo de 5 aplicaciones alternadas por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 7 a 10 días. Se recomienda rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 4 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD

FUNGISEI® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

FUNGISEI® no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere de mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Usar overol, botas, guantes resistentes a químicos, mascarilla, protector de ojos y rostro contra salpicaduras.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso del contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 10 minutos.
- En caso del contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con jabón y abundante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene aplique respiración artificial.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

Tel. del titular: AGRILAB: (01)363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Fungisei®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Bacillus subtilis (Cepa IAB/BS03).....1x10⁸ UFC/ml
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° 006-SENASA-PBA-ACBM

Titular de Registro: L&M SERVICIOS AGRÍCOLAS
INTEGRALES SAC
Av. Javier Prado Este 488 Piso 9,
San Isidro. Lima, Perú
Teléfono: (01) 382-4874

Formulado por:

SEIPASA S.A.
C/ Almudévar N° 2
22240 Tardienta, Huesca - España
Tel.: +34 962 541 163

seipasa®

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147, Oficina 701-B
Santiago de Surco, Lima - Perú
Tel. +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Contenido Neto: 20L

N° de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **FUNGISEI®** es un biofungicida que actúa previniendo y controlando enfermedades fúngicas y bacterianas en plantas. La cepa patentada de *Bacillus subtilis* contenida en **FUNGISEI®** produce un grupo de lipopéptidos de amplio espectro que controlan hongos y bacterias.
- Su modo de acción se basa en la interrupción de la pared celular provocando la rotura de la membrana celular de los patógenos. Así mismo evita la germinación de las esporas previniendo la instalación del patógeno y destruye el tubo germinativo. Por otro lado, **FUNGISEI®** tiene un efecto como inductor de defensas creando una resistencia sistémica de la planta a la enfermedad (Resistencia Sistémica Inducida), promoviendo los mecanismos de defensa natural de la planta durante prolongados períodos de tiempo.
- **FUNGISEI®**, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores y por inyección al sistema de riego. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- **FUNGISEI®** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.
- Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. No permitir que la mezcla se quede realizada sin utilizar durante un largo periodo de tiempo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia / LMR: Límite máximo de residuos / N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
- Se recomienda un máximo de 5 aplicaciones alternadas por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 7 a 10 días. Se recomienda rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 4 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD

FUNGISEI® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

FUNGISEI® no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere de mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Usar overol, botas, guantes resistentes a químicos, mascarilla, protector de ojos y rostro contra salpicaduras.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso del contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 10 minutos.
- En caso del contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con jabón y abundante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene aplique respiración artificial.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

Tel. del titular: AGRILAB: (01)363-8659

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No arrojar los sobrantes del producto, ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Fungisei®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Bacillus subtilis (Cepa IAB/BS03).....1x10⁸ UFC/ml
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° 006-SENASA-PBA-ACBM

Titular de Registro: L&M SERVICIOS AGRÍCOLAS
INTEGRALES SAC
Av. Javier Prado Este 488 Piso 9,
San Isidro. Lima, Perú
Teléfono: (01) 382-4874

Formulado por:

SEIPASA S.A.
C/ Almudévar N° 2
22240 Tardienta, Huesca - España
Tel.: +34 962 541 163

seipasa®

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Los Tulipanes 147, Oficina 701-B
Santiago de Surco, Lima - Perú
Tel. +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Contenido Neto: 200L

N° de lote:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **FUNGISEI®** es un biofungicida que actúa previniendo y controlando enfermedades fúngicas y bacterianas en plantas. La cepa patentada de *Bacillus subtilis* contenida en **FUNGISEI®** produce un grupo de lipopéptidos de amplio espectro que controlan hongos y bacterias.
- Su modo de acción se basa en la interrupción de la pared celular provocando la rotura de la membrana celular de los patógenos. Así mismo evita la germinación de las esporas previniendo la instalación del patógeno y destruye el tubo germinativo. Por otro lado, **FUNGISEI®** tiene un efecto como inductor de defensas creando una resistencia sistémica de la planta a la enfermedad (Resistencia Sistémica Inducida), promoviendo los mecanismos de defensa natural de la planta durante prolongados períodos de tiempo.
- **FUNGISEI®**, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores y por inyección al sistema de riego. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.
- **FUNGISEI®** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.
- Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación. No permitir que la mezcla se quede realizada sin utilizar durante un largo periodo de tiempo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4 - 0.6	N.A.	N.A.
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.6 - 0.8	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia / LMR: Límite máximo de residuos / N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar de manera preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
- Se recomienda un máximo de 5 aplicaciones alternadas por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 7 a 10 días. Se recomienda rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 4 horas después de la aplicación (una vez secado el depósito en el área foliar).

COMPATIBILIDAD

FUNGISEI® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

FUNGISEI® no es fitotóxico usado a la dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere de mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 • TELÉFONO DEL TITULAR AGRILAB: (01) 363-8659
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Contenido Neto: 500 ml

N° de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere de mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



Fungisei®

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Bacillus subtilis (Cepa IAB/BS03).....1x10⁸ UFC/ml

Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° 006-SENASA-PBA-ACBM

Titular de Registro: **L&M SERVICIOS AGRÍCOLAS INTEGRALES SAC**

Formulado por: **SEIPASA S.A.**

Importado y distribuido por: **POINT ANDINA S.A.**



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO