


Rimon® Duo

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Novaluron	50 g/L
Bifenthrin	50 g/L
Aditivos	c.s.p.1 Litro

ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000



Contenido neto: **4 Litros**
Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa

- Este producto es dañino, no ingerir ni inhalar la aspersión.
- Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar seco, seco y ventilado.
- Mantener el envase que haya contenido plaguicidas se debe utilizar para conservar alimentos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No desatorar las boquillas soplando con la boca.

- Grupo químico: Benzofenil urea + Ftorado
- En caso de intoxicación lávelle al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos mantenga el párpado abierto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- ALERGIAS: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

- **TÉLEFONOS DE EMERGENCIA**
SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



- Peligroso para abejas y otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/Cil)	(L/Ha)		
Arandano	Gusano perforador del fruto	<i>Heliothis virescens</i>	0.3	-	7	1.8 ¹ /7 ¹
Brócoli	Gusano de la col	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	-	7	0.4 ¹ /0.7 ¹
Frijol	Gusano medidor	<i>Chrysodeixis includens</i>	0.2	-	14	0.3 ¹ /0.1 ¹
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	-	100	0.05 ¹ /0.05 ²
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.2	-	30	0.5 ¹ /0.6 ¹
Pimiento	Gusano perforador del fruto	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.75 - 1.0	7	0.5 ¹ /0.7 ¹
	Polilla	<i>Symmetrischema capsicum</i>	-	0.75 - 1.5		

LMR : Limite Máximo de Residuos (en partes por millón). 1-Bifenthrin / 2-Novaluron

Realizar hasta dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 días. Considerar una (01) campaña al año en los cultivos de arándanos, paltos y pimientos, y dos (02) en brócoli, frijol y maíz.

Momento de aplicación
Ver la hoja informativa.

PERIODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
Ver la hoja informativa adjunta.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa