

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte.
- Antídoto: No tienen antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 0800-1-3040; INFOSALUD : 0800-10828; CISPROQUIM: 080-050847; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para plantas acuáticas y semi-acuáticas
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ADAMA

Exodo[®]
400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Pendimethalin400 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1129 - SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V.
Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int, Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

Contenido Neto: 20 Litros

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Exodo 400 EC es un herbicida pre-emergente recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y angosta que se absorbe por las raíces y brotes. Las plántulas emergidas presentan síntomas similares a deficiencia nutricional (enrojecimiento) o de sequía debido al pobre desarrollo del sistema radicular. La pendimethalin actúa inhibiendo la mitosis y división celular en la planta. Para asegurar la efectividad del control, preparar el suelo adecuadamente, libre de terrones y basura, utilizar boquillas de abanico que produzcan gotas de $\geq 400 \mu m$ y suficiente cantidad de agua (200 - 400 L/ha) para lograr un buen cubrimiento del área tratada y mantener una buena humedad de campo. La superficie tratada no debe removerse después de la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), Yuyo (<i>Amaranthus hybridus</i>), Hierba mora (<i>Solanum nigrum</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), capullí cimarrón (<i>Nicandra physalodes</i>), Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>), Rabo de zorro (<i>Setaria verticillata</i>)	2 - 3	90	0.1
ARROZ	Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>), Grama dulce (<i>Cynodon dactylon</i>), Malva (<i>Malvastrum coromandelianum</i>)	3.0 - 3.5	180	0.1
CEBOLLA	Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), Yuyo (<i>Amaranthus hybridus</i>), Hierba mora (<i>Solanum nigrum</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Malva (<i>Malvastrum coromandelianum</i>), Hierba gallinazo o paico (<i>Chenopodium ambrosioides</i>), Pega-pega (<i>Setaria verticillata</i>)	2.5 - 3.0	110	0.1
PIMIENTO	Capullí cimarrón (<i>Nicandra physalodes</i>), Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), Yuyo (<i>Amaranthus hybridus</i>), Hierba mora (<i>Solanum nigrum</i>), Pega-pega (<i>Setaria verticillata</i>)	2.0	70	0.1

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña-año:1

Alcachofa: Realizar la aplicación en pre-emergencia de las malezas, 1 a 2 días antes del transplante.

Arroz: Realizar la aplicación en pre-emergencia de las malezas, luego de la germinación del cultivo (10 -12 días después de la siembra).

Cebolla: Realizar la aplicación en pre-emergencia de las malezas luego del transplante del cultivo.

Pimiento: Aplicar antes del trasplante, o después de los 7 o 10 días del cambio de surco sobre la línea de riego.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

El pendimethalin es compatible con otros herbicidas residuales como metribuzina, atrazina y oxyfluorfen, sin embargo se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

No es compatible con sustancias alcalinas.

FITOTOXICIDAD

Exodo 400 EC aplicado bajo las condiciones y dosis recomendadas no presenta riesgo de fitotoxicidad al cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 330 mm x 200 mm