

Crecigib®

4% SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido giberélico/GA3.....40 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PBUA N° 084-SENASA


Grupo Químico: Hormona vegetal

Nombre Químico: (3S,3aS,6S,8aR,11-dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4^a,6-ethano-3,8-pro-1-enopheydroindeno-(1,2-B)furan-4-ácido carboxílico.

Fórmula empírica: C₁₉H₂₂O₆

Peso molecular: 346.38 g/mol.

Formula estructural:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Líquido

Densidad: 0.80 g/ml

pH: 3-4

Corrosividad: No corrosivo

Inflamabilidad: Inflamable

Presentaciones comerciales: 25ml, 30ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 20L, 200L

Titular del registro: POINT ANDINA S.A

Importado y distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:

POINT INTERNATIONAL LTD.

42 St. Margarets Grove

Twickenham TW1 1JG

United Kingdom

Tel. (44-20) 8892 3862



INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito y consultar al médico.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente a un lugar con aire fresco.
- Contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
- Contacto con la piel, lavarla con abundante agua y jabón.
- No existe antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106;

POINT ANDINA S.A: (01) 348-1018; CISPROQUIM: 080-050-847

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



PRECAUCIÓN



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Almacenar y transportar en un lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CRECIGIB® 4% SL es un regulador de crecimiento de acción hormonal que estimula y regula el desarrollo de las planta, su ingrediente activo es el ácido giberélico GA3, sustancia que se encuentra de manera natural en las plantas.

CRECIGIB® 4% SL induce a un incremento en el crecimiento y desarrollo de las plantas así como también incrementa el vigor de las mismas.

Modo de empleo

Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad del tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. No aplicar en presencia de lluvias o con temperaturas altas. Es mejor realizar las aplicaciones por las tardes. Guardar el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol y a altas temperaturas. Se recomienda regular el pH del agua de 5 a 6, siendo el pH ideal para este producto.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En alcachofa y vid: aplicar en crecimiento vegetativo, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico.

En palto: realizar 2 aplicaciones por campaña/año, la primera aplicación cuando los frutos tengan entre 30 - 50 mm y la segunda aplicación 15 días después de la primera aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CRECIGIB® 4% SL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común menos con los de naturaleza alcalina o ácida.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendadas.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS (ml/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
Alcachofa	Crecimiento vegetativo	25 - 50	0	0.15
Vid	Crecimiento vegetativo	150	0	5
Palto	Crecimiento del fruto	200 - 250	0	N.A

PC: Período de carencia en días.
LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón).
N.A: No aplica

