

CONFIDE®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Citoquinina	18.9 g/L
Giberelinas	18.9 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Reg. RCP N° XXX - SENASA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado: Líquido

Color: Incoloro

pH: 3 - 7

Densidad: 1.05 g/ml (20 °C)

Inflamabilidad: No inflamable

Propiedades explosivas: No explosivo

Solubilidad en agua: 100%

PRESENTACIONES COMERCIALES:

30ml, 60ml, 125ml, 500 ml, 1 L, 4 L, 20 L y 200L

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfonos: 3481018 / 3499609

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA Ltd

Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East

Renmin Road, Jiangyin, Jiangsu, China.

Tel. (86-510)80618101,

Fax. (86-510)80618087



INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: • En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta o esta hoja informativa.

• Contacto con los ojos: lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos levantando los párpados. No se debe esperar ninguna lesión. si se produce irritación busque atención médica. • Contacto con la piel: Quitarse las prendas contaminadas y lava el área de la piel afectada con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. • Ingestión: no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente. • Inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente y a la sombra. • No tiene antidoto específico. Tratar según síntomas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: POINT ANDINA S.A.: (01) 348

1018; SAMU: 106; CIPROSQUIM: 080 050 847

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. • En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios designado ppor las autoridades locales para este fin. • No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. • No permita animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

• Evite el contacto con la piel y ojos. • Este producto es nocivo si se ingiere. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. • Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. • Utilice equipo de protección personal, como overol, botas, guantes resistentes a químicos, mascarilla y gafas de seguridad. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONFIDE es un regulador de crecimiento a base de citoquininas y giberelinas, que promueve el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Las citoquininas estimulan el crecimiento de las yemas laterales y el desarrollo de los frutos por división celular. Asimismo, las giberelinas son activos promotores de la elongación celular, por lo que su presencia se asocia al crecimiento.

Preparación de la mezcla: Se llena la mochila de aplicación con la mitad del agua a emplear. En un recipiente aparte, se realiza la mezcla del producto y se remueve hasta conseguir una solución homogénea; se vierte al tanque y se completa el nivel de agua a usar en la aplicación, manteniendo la mezcla en agitación constante. No exceder las dosis recomendadas en esta etiqueta en una sola aplicación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar de 2 aplicaciones por campaña, al inicio de la tuberización, con intervalo entre aplicaciones de 15 días.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso al área tratada, 24 horas después de la aplicación. No ingresar antes a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada.

COMPATIBILIDAD:

CONFIDE es compatible con la mayoría de los plaguicidas y sustancias afines. Se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla en el tanque.

FITOTOXICIDAD

CONFIDE no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos y/o susceptibles.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	USO	DOSIS (ml/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	OBJETIVO			
Papa	Incremento de altura de planta y grosor del tallo	60	N.A.	N.A.

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón).

N.A.: No aplica.

