

AGROGIBB

(Acido Giberélico)

Regulador de Crecimiento de Plantas

Tabletas Solubles - ST

COMPOSICION QUIMICA:

Ácido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidro-
3-metil-6-metilene-2-oxoperhidro- 4^a,7- metano-9b,3

propeno [1,2-b] furan-4-carboxílico 10%
Ingredientes Inertes 90%

Regulador de Crecimiento de Plantas

Nº DE REGISTRO: PBUA Nº 163-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO

**Av. Jose Pardo 620 Of. 409
Miraflores - Lima**

Fabricado Por:

**SHANGHAI KELINON
AGROCHEMICAL CO., LTD**
1201, Jinling Int'l Mansion, N° 85 Ouyang Road,
Hongkou, CHINA

Importador y Distribuidor:

CAPEAGRO S.A.C.
Calle Elías Aguirre 141 of. 305
Miraflores. Lima - Perú.

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 10 Tabletas

**LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCIÓN**

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES:

Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de productos fitosanitarios. Usar equipo de protección personal adecuado durante la manipulación del producto como guantes y botas de goma. Durante la aplicación utilizar protector facial, que impida el contacto del producto con los ojos; guantes, pechera y botas, que impidan el contacto del producto con la piel. En aplicaciones en altura usar protector facial. Evitar inhalaciones y contacto con ojos, nariz y boca. No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación. Después del trabajo cámbiese y lave la ropa de trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Exposición Oral: En caso de ingestión accidental se debe proceder a inducir al vómito introduciendo un dedo a la garganta y luego consultar con un médico.

Exposición por Inhalación: Los individuos deben ser alejados de la exposición de una concentración demasiado alta del producto. Se recomienda evitar su inhalación.

Exposición del Ojo: Lavar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Observar la irritación del ojo y buscar ayuda médica si la irritación llega a ser significativa.

Exposición Cutánea: Lavar la zona afectada de la piel inmediatamente con abundante agua y jabón neutro. Si ocurre irritación de la piel o eritema, el paciente debe buscar ayuda médica.

Antídotos: No tiene antídoto específico. Si el ácido giberélico ha sido ingerido no hay ninguna razón para esperar efectos adversos.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: 445-5346. ESSALUD: 0801-10200 opción 4.

Toxicología del Producto Formulado: DL50 oral > 5,000 mg/kg; DL50 dermal > 2,000 mg/kg

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

INFORMACIÓN GENERAL:

AGROGIBB es un regulador hormonal que estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas. Aplicado en mínimas concentraciones, actúan en los procesos fisiológicos y morfológicos de las plantas.

Preparación y Aplicación: Llenar el cilindro con la cantidad de agua requerida, sacar en un balde un litro de agua del cilindro para disolver las tabletas de **AGROGIBB** a la dosis requerida, una vez disuelto vaciar al cilindro y remover para que quede una mezcla uniforme. El modo de aplicación se realiza de acuerdo al objetivo que se quiere del cultivo.

USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO Y DOSIS

CULTIVO	OBJETIVO DE LA APLICACIÓN	DOSIS Tab/200 L	*PC (días)	*LMR (ppm)
Vid (var, con/sin pepa)	Aplicar cuando los granos tengan de 5 a 6 mm de diámetro, incrementarán de tamaño.	4 - 5	14	5
Papa	Para interrumpir la latencia de tubérculos y estimular el brotamiento uniforme. Tratamiento para 2 TM de papa/3 min.	5	14	2
Tomate	Inducir un mejor cuajado de frutos. Aplicar durante la floración dirigiendo hacia los racimos florales.	2 - 4	—	2
Alcachofa	Aplicar al inicio de la formación del eje floral y después de 15 días.	2 - 3	—	--
Café	Para inducir floración uniforme aplicar cuando los botones florales estén hinchados o en primeras aperturas florales	2 - 4	—	10
Sandía	Al aplicar al inicio de la floración incrementa la producción, cuando se aplica a los frutos incrementa tamaño y calidad.	2 - 4	—	10
Naranja	Aplicar antes del cambio de color de los frutos para retardar maduración y uniformizar cosecha.	2 - 4	—	10

*PC: Período de carencia.

*LMR: Límite máximo de residuos.

FITOTOXICIDAD: No se recomienda el uso del producto en naranjos de la variedad Valencia.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto los productos de reacción alcalina.

ADVERTENCIA

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS"

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO"

