



Complejo de aminoácidos concentrado (80% libres), especialmente diseñado para momentos de estrés, que estimula el crecimiento y protección de las plantas bajo condiciones adversas. Posee un alto contenido aminoácidos osmoprotectores y termoprotectores como prolina y serina, entre otros.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Aminoácidos libres	80 % p/p
L-alfa-aminoácidos	100 % p/p
Nitrógeno total	12,8 % p/p
Nitrógeno orgánico	12,8 % p/p



BENEFICIOS

- Naturamin WSP ejerce un efecto estimulante durante la etapa de crecimiento activo y fructificación del cultivo.
- Ayuda a superar situaciones de estrés (fitotoxicidad, sequía, enfermedades, heladas, etc.)
- De aplicación foliar o vía riego.
- Puede ser aplicado durante todas las etapas del cultivo.



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO	OBJETIVO
Uva de mesa y Vid vinífera	Foliar: 0,3-1 Kg/ha Vía riego: 0,3-5 Kg/ha	Aplicar desde floración hasta precosecha. Repetir en tratamiento para color junto a potasio. En precosecha realizar a lo menos 2 aplicaciones para estimular calibre.	Antiestrés abiótico
Cerezos		Aplicar desde pre floración, en conjunto con tratamientos para calibre (estado de globo, ramillete y caída de chaqueta). Repetir a los 30 y 15 días precosecha.	
Carozos		Aplicar desde yema hinchada a caída de chaqueta. Repetir en precosecha.	
Pomáceas		Aplicar desde yema hinchada a caída de chaqueta. Repetir en precosecha.	
Paltos		Riego: Aplicación primaveral; 1ra quincena de noviembre.	
Limones		Otoñal: 1ra quincena de marzo.	
Mandarinas y Naranjas		Aplicaciones foliares en todo el periodo, principalmente en condiciones de estrés.	
Almendros		Desde botón floral hasta crecimiento de fruto. Repetir principalmente en condiciones de estrés.	
Nogales		Crecimiento de frutos hasta precosecha. Aplicar preferentemente vía riego (aplicaciones foliares podrían generar toxicidad, si es que hay aplicaciones de cobre en el cultivo).	
Avellanos		Aplicar desde inicio de brotación.	
Arándanos y Berries		Aplicación foliar: desde inicio de brotación y postcosecha. En cultivo orgánico aplicar vía riego de manera parcializada, semanalmente (3 Kg/ha por 5 semanas) desde inicio de actividad radicular.	
Raps y Lupino		Aplicar en todo el período vegetativo (desde 2 hojas), especialmente pre y post condición de estrés.	
Cereales		Aplicar en todo período vegetativo, especialmente pre y post condición de estrés. Realizar 3 a 5 tratamientos por temporada.	
Hortalizas y cultivos menores		Aplicar en todo período vegetativo, especialmente pre y post condición de estrés. Realizar 2 a 3 tratamientos por temporada.	
Praderas y Ornamentales			

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA
Cumple con norma
NOP, JAS, CE, NCH



PRODUCTO APROBADO PARA LA
AGRICULTURA ORGÁNICA

