



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR

EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No se debe comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón.
- Manténgase en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugares frescos y secos alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.
- No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Ácidos verdínicos.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, llamar al médico o acudir a un centro de salud. No administre nada a una persona inconsciente.
- En caso de contaminación de la piel, quite la ropa y enjuague el área afectada con abundante agua y jabón.

Si los síntomas persisten acudir al médico.

- En caso de contaminación en los ojos, enjuagar con abundante agua por lo menos 15 minutos. Acudir a un centro médico si se desarrolla irritación.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire al paciente de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente en reposo y vigile que éste respire. Llamar al médico inmediatamente.
- Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
SAMU: 106 BAYERS S.A.: 2113800
CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROCUM: 0800-50847
ESSALUD EN LÍNEA: 4118000 (OPC. 4)

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inculcilo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlarla deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



Movento®
150 OD

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA
Dispersión Oleosa (OD)

Composición:
Spectantrat, 150 g/l
Aclitova, esp. 1 L

Reg. POLUA N° 361-SEMESA
Bayer S.A.
Banco de la República 3074
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima Perú
Tel: 2113800


Formulado por:
Bayer CropScience
D-51368
Leverkusen
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Banco de la República 3074
San Isidro, Lima Perú
Tel: 2113800

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO

LEGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO





Fórmula estructural

Fórmula empírica: Spirotetramat: C₂₇H₂₇NO₅

Peso molecular: Spirotetramat: 373.45 g/mol

Propiedades físicas y químicas:

Estado físico: Líquido, suspensión

Color: Café claro

Olor: Mohoso débil

Densidad relativa: 0.980 g/cm³

pH: 4.5

Inflamabilidad: No Inflamable

Explosividad: No Explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Reactividad: No reactivo con los materiales recomendados HDPE

USO ESPECÍFICO: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"							
CULTIVO	PLAGAS			DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	l/ha	ml/cil.	%		
Espinargo	Mosquilla de los brotes	<i>Prodictosia longifolia</i>	0.5	--	0.1	46	0.1
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodictosia longifolia</i>	0.5	--	0.1	7	2
Vid	Trips	<i>Trips tabaci</i>	0.5	--	0.05	7	3
Pimiento	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	--	--	0.075	7	3
	Mosquilla de los brotes	<i>Prodictosia longifolia</i>	0.5	--	--	3	2
Mandarina	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.5	--	--	3	2
	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckeri</i>	--	--	0.075	21	1
Zapallo	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.5	--	--	3	0.2
Granado	Pulgón	<i>Myzus persicae</i>	--	--	0.05-0.06	20	0.1
	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	--	--	0.075	20	0.1
Arveja	Mosquilla de los brotes	<i>Prodictosia longifolia</i>	0.5	--	--	7	1.5
Palo	Queresa	<i>Fiorinia litoralis</i>	--	150	0.075	7	--
	Mosca blanca	<i>Aleuriodius coccis</i>	--	--	0.06	7	0.6
Papa	Queresa	<i>Hemiberesia latraiae</i>	--	--	0.075	7	--
	Mosquilla de los brotes	<i>Prodictosia longifolia</i>	0.5	--	--	7	0.8
Arándanos	Mosquilla de los brotes	<i>Prodictosia longifolia</i>	--	--	0.075	1	0.7

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Movento 150 OD es un nuevo insecticida foliar que contiene Spirotetramat, que inhibe la biosíntesis de los lípidos de tal manera que la planta no puede completarla, ocasionando la muerte del insecto. Spirotetramat actúa sobre el insecto plaga vía

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se aplica en forma general al nivel de control de plagas. Para el control de Planococcus citri, el mejor momento para las aplicaciones es cuando la planta se encuentra en una alta actividad fisiológica o en pleno desarrollo.

Se recomiendan 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 días rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas

COMPATIBILIDAD:

Antes de mezclar con insecticidas, fungicidas o abonos foliares realice una prueba de compatibilidad. Debido al tipo de formulación no se requiere adicionar coadyuvantes.

FITOTOXICIDAD:

Movento 150 OD posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones de uso y manejo. El titular del registro no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del uso incorrecto del producto, con el titular del registro o con el distribuidor del producto."

