

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No desatorar las boquillas soplando con la boca.
- No utilizar este envase para conservar alimentos o agua potable.
- Almacenar este producto bajo techo, en un lugar fresco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Tetrazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos, acuda a un médico. Si el contacto fuese con la piel retírese la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación llevar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Si se siente enfermo buscar ayuda médica.
- Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CISPROQUIM: 0800-050-847; CICOTOX: 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Acaristop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA ACARICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Clofentezine 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000.

Formulado por:
SAFAPAC Ltd.
4 Stapledon Road, Orton Southgate,
Peterborough - Reino Unido.
para:
ADAMA Irvita N.V.
Pos Cabai Office park, Unit 13
Curacao - Antillas Neozelandesas

CONTENIDO NETO: **200 Litros**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Acaristop es un acaricida de contacto que actúa durante las fases embrionarias (huevos) finales y el desarrollo larvario temprano, por lo que debe aplicarse en infestaciones muy tempranas, cuando se observan los primeros huevos en las hojas. **Acaristop** no actúa sobre acaros adultos. Utilizar altos volúmenes de agua de tal forma que la aplicación sea uniforme, cubrir completamente el follaje (sin llegar al punto de escurrimiento) especialmente en el envés de las hojas que es el sitio preferido por los ácaros. Utilizar las dosis altas cuando se tenga más del 30% de plantas infestadas. **Acaristop** mezclado con aceite agrícola en dosis bajas (200 ml de aceite en 100 litros de agua) logra un buen control tanto de adultos como huevos, si las infestaciones son iniciales.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (mL/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Alfalfa	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.02
Algodonero	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.05
Melón	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.02
Sandia	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.02
Zapallo	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.02
Duraznero	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	60 - 80	28	0.2
Espárrago	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.02
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	28	2.0
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	80	28	0.5
	Ácaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	60 - 80		
Manzano	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	60 - 80	28	0.5
Marigold	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	N.D.	0.02
Ornamentales (Rosal)	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	-	-
Naranja	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	60 - 80	28	0.5
Palto	Acaro	<i>Oligonychus punicae</i>	60	24	0.3
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	40 - 60	28	1.0

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos N.D.: No determinado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Máximo una (1) aplicación por campaña y año. Realizar la aplicación cuando se observen las primeras posturas de huevos (menos de 5 por hoja).
Momento de aplicación:
Espárrago: Durante desarrollo de fruto; Fresa: Entre brotamiento hasta 28 días antes de la cosecha; Mandarina y naranja: Brotamiento y crecimiento vegetativo; Manzano y durazno: Desde cuajado de frutos; Palto: Entre cuaje hasta 24 días antes de la cosecha; Vid : Aplicar en brote de 40 - 50 cm.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

FITOTOXICIDAD


No se ha registrado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos y dosis recomendados.

COMPATIBILIDAD

En caso de mezclas con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Dimensiones: 330 mm x 200 mm