

ADAMA

Exodo®
400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN:
Pendimethalin..... 400 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1129 - SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N° 7-53 Interior
Zona Franca Barranquilla, Colombia.

Contenido Neto: 5 Litros

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
 - Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
 - Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Dinitroanilinas
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta. No deje solo al intoxicado.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte
 - Antídoto: No tienen antídoto específico
 - **TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
CICOTOX: 0800-13040; INFOSALUD: 0800-10-828; CISPROQUIM: 080-050847, ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para plantas acuáticas y semi-acuáticas
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Exodo 400 EC es un herbicida pre-emergente recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y angosta que se absorbe por las raíces y brotes. Las plántulas emergidas presentan síntomas similares a deficiencia nutricional (enrojecimiento) o de sequía debido al pobre desarrollo del sistema radicular. Para asegurar la efectividad del control, preparar el suelo adecuadamente, libre de terrones y basura, utilizar boquillas de abanico que produzcan gotas de ≥ 400 um y suficiente cantidad de agua (200 - 400 L/ha) para lograr un buen cubrimiento del área tratada y mantener una buena humedad de campo. La superficie tratada no debe removerse después de la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	Amor seco (Bidens pilosa), Yujo (Amaranthus hybridus), Hierba mora (Solanum nigrum), Verdolaga (Portulaca oleracea), capulí cimarrón (Nicandra physalodes), Pata de gallina (Eleusine indica), Rabo de zorro (Setaria verticillata)	2-3	90	0.1
ARROZ	Amor seco (Bidens pilosa), Conejuela (Convolvulus arvensis), Grama dulce (Cynodon dactylon), Malva (Malvastrum coromandelianum)	3.0-3.5	180	0.1
CEBOLLA	Amor seco (Bidens pilosa), Yujo (Amaranthus hybridus), Hierba mora (Solanum nigrum), Verdolaga (Portulaca oleracea), Malva (Malvastrum coromandelianum), Hierba gallinaza o paico (Chenopodium ambrosioides), Pega-pega (Setaria verticillata)	2.5-3.0	110	0.1
ESPÁRRAGO	Amor seco (Bidens pilosa), Yujo (Amaranthus hybridus), Verdolaga (Portulaca oleracea), Chamico (Datura stramonium), Pata de gallina (Eleusine indica), Hierba gallinaza (Chenopodium murale), Pega-pega (Setaria verticillata)	2.0	14	0.15
PIMIENTO	Capulí cimarrón (Nicandra physalodes), Yujo (Amaranthus hybridus), Amor seco (Bidens pilosa), Pega-pega (Setaria verticillata)	2.0	70	0.1

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
Ver hoja informativa adjunta.
PERÍODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.
RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CARA

CONTRACARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

Esta etiqueta requiere hoja informativa