

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA


POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Pythium oligandrum (Mínimo 1 millón de oosporas/g) Mín. 100 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1Kg

Reg. N° 090-SENASA-PBA-ACBM



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular de Registro, Importado y

Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Teléfono +51 (01) 348 1018

Formulado por:

BIOPREPÁRÁTY, spol. S R.O.,

Tylišovská 772/1, 160 00 Praha 6,

Czech Republic

Contenido Neto: 250g

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera. Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si la persona tiene dificultad para respirar, dar respiración artificial. En caso de emergencias llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018 SAMU: 106; CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EL DORADO® POLYVERSUM es un fungicida biológico con acción de contacto para el control de un amplio espectro de patógenos.

EL DORADO® POLYVERSUM coloniza el ecosistema de la planta a través de 3 mecanismos de acción: micoparásita al patógeno, induce resistencia de la planta mediante la producción de oligandrina y estimula su crecimiento mediante la producción de triptamina.

Para su aplicación: Utilice agua a pH entre 6-7. Realice una pre-mezcla 2-4 horas antes de la aplicación para la activación de las oosporas. Luego verter el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al inicio de las infestaciones o preventivamente cuando se observen las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo del patógeno.

Vid y fresa: Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año, considerando 1 campaña al año. Pimiento: Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año, considerando 10 días entre aplicaciones. Alcachofa: Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año, considerando 10-15 días entre aplicaciones. Palto: Se recomienda 2 aplicaciones/campaña en la etapa de floración, considerando 1 campaña/año y un intervalo de 15 días entre aplicaciones. El gasto de agua es de 1000-1200 L/ha. Granado: Se recomienda 2 aplicaciones/campaña considerando 1 campaña/año y un intervalo de 15 días entre aplicaciones. Arándano: Se recomienda 3 aplicaciones/campaña y un intervalo de 7 a 15 días entre aplicaciones. Cacao: Se recomienda 3 aplicaciones/campaña y un intervalo de 15 - 30 días entre aplicaciones. Arroz: Se recomienda 4 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año y un intervalo de 14 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas durante una hora después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los que tienen reacción alcalina. No mezclar con fungicidas químicos. Se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla en el tanque.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200L		
Arándano	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4	-	N.A.	N.A.
	Oídiosis de arándano	<i>Microsphaera vaccinii</i>	-	0.08 - 0.1	N.A.	N.A.
Vid	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.06 - 0.08	N.A.	N.A.
Fresa	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.1	-	N.A.	N.A.
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25 - 0.3	-	N.A.	N.A.
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.25 - 0.3	-	N.A.	N.A.
Palto	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4*	-	N.A.	N.A.
Granado	Alternaria	<i>Alternaria alternata</i>	0.4	-	N.A.	N.A.
Cacao	Moniliasis del cacao	<i>Moniliophthora roreri</i>	-	0.08 - 0.1	N.A.	N.A.
Arroz	Falso carbón	<i>Ustilaginoidea virens</i>	-	0.1	N.A.	N.A.

P.C.: Período de Carenia. | N.A.: No Aplica | L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón). | *Gasto de agua:1000 - 1200 L/ha

