# BROTUVIO

BROTUVIO es un potente bioestimulante activador del sistema inmunológico de la planta. Corresponde a una mezcla de extractos vegetales y nutrientes cuyo complejante actúa como un potente elicitor. Está especialmente recomendado en situaciones de estrés abiótico, tales como altas y bajas temperaturas, estrés hídrico, estrés salino y fiebre de primavera. Promueve la fotosíntesis y procesos fisiológicos esenciales para un buen desarrollo vegetativo y de frutos.

En período de postcosecha BROTUVIO mantiene las plantas con mayor actividad metabólica, impactando positivamente en la acumulación de arginina en estructuras de reserva.

BROTUVIO se absorbe rápidamente vía hojas, tallos y raíces.

BROTUVIO es traslocado muy fácilmente por la planta, asegurando un movimiento ascendente y descendente.

Aplicación Foliar

Aplicación Radicular

| INGREDIENTE ACTIVO | FORMULACIÓN | ELEMENTO | CONCENTRACIÓN |
|---|---|---|---|
| Nitrógeno + Cobre Manganeso + Zinc | Concentrado Soluble (SL) | Nitrogeno (N) | 5,00 % p/p (50 g/Kg) |
| | | Cobre (Cu) | 1,75% p/p (17,5 g/Kg) |
| | | Manganeso (Mn) | 0,75 % p/p (7,5 g/Kg) |
| | | Zinc (Zn) | 0,50 % p/p (5 g/Kg) |

Agente Complejante: Ácidos Lignosulfónicos

COMAGRO

FICHA TÉCNICA

## RECOMENDACIONES DE USO

| Cultivo | Dosis (cc/100 L) | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cerezo<br>Carozos (excepto ciruelo)<br>Cítricos<br>Paltos<br>Kiwi<br>Nogal<br>Pomáceas<br>Uva de mesa<br>Vid vinífera<br>Avellano Europeo | 250 - 300 | 3- 4 | Aplicar desde brotación hasta post- cosecha (sin límite de aplicaciones), bajo cualquier situación de estrés, fiebre de primavera, intoxicaciones o para sustentar altas exigencias de los cultivos.<br>Normalmente se recomienda aplicar con brotes de 10 a 15 cm y repetir a los 7 días (mínimo de 2 aplicaciones).<br>También se puede aplicar junto a reguladores de crecimiento.<br>Mojamiento: 1.000 a 1.500 L/ha de agua.<br>dependiendo de la especie y estado fenológico.<br>Aplicación vía riego 4 a 6 L/ha |
| Plantas en formación | 250 - 300 | - | Aplicar con buen mojamiento, cada 7 a 10 días.<br>Excelente complemento a reguladores de crecimiento utilizados para la inducción de ramas laterales. |
| Frambuesa, Arándanos<br>Frutillas, Mora | 250 - 300 | 1,5 - 2,5 | Aplicar desde brotación hasta post-cosecha (sin límite de aplicaciones), bajo cualquier situación de estrés, fiebre de primavera, intoxicaciones o para sustentar altas exigencias de los cultivos.<br>Aplicación vía riego 3 a 5 L/ha |
| Hortalizas | 250 - 300 | 1 - 2,5 | Aplicar desde trasplante a cosecha.<br>Aplicación vía riego 3 a 5 L/ha |

| METALES PESADOS | | |
|---|---|---|
| | Plomo (Pb) | < 2,0 ppm |
| | Arsenico (As) | < 2,0 ppm |
| | Cadmio (Cd) | < 0,5 ppm |
| | Mercurio (Hg) | < 0,2 ppm |

| | |
|---|---|
| pH(al 0,2% a 20 ° C) | 5,00 |
| Densidad | 1,10 - 1,20 |
| Solubilidad | 100% |

BROTUVIO

## PRECAUCIONES

Aplicar vía foliar asegurando una buena homogeneidad de la solución.

Aplicar vía riego con sistemas tecnificados (goteros o microaspersores).

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

## COMPATIBILIDAD

No mezclar con aceites, aminoácidos, azufres, cobres, captan y productos en base a zinc. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

## TIEMPO DE REINGRESO

Sin restricciones.pequeña escala para observar los aspectos físicos de la mezcla.

COMAGRO

## PRESENTACIÓN

| 1LT. | 5LT. | 10LT. | 20LT. | 200LT. | 1.000LT. |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ⊗ | ⊗ | ○ | ○ |

## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

Importado y distribuido por Comagro SPA.
contacto@comagrochile.cl
www.comagrochile.cl
Fabricado por Uvio R&D, España.

UVIO R&D