

Almagor[®] EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Composición:	
Azoxystrobin	56 g/L
Tebuconazole	100 g/L
Prochloraz	200 g/L
Aditivos	c.s.p.1 Litro

Titular de Registro:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 306
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Importador y Distribuidor:
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

- El producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- Grupo químico: strobilurina, imidazole y triazole.
- No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- Teléfonos de emergencia: SAMU: 106. ADAMA Agriculture Perú S.A.: 6410000.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe ser reutilizado. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Agitar el envase antes de abrir y preparar la mezcla de aplicación de acuerdo con la dosis indicada en el cuadro de usos. Aplicar al follaje con equipo de pulverización terrestre utilizando un volumen de agua que asegure una buena cobertura de las plantas.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200 L	L/ha		
Arroz	Pudrición de la vaina	<i>Sorocladium oryzae</i>	1.0 - 1.5	1.3 - 1.95*	35	5.0 ¹ , 1.5 ² , 2.0 ³
Cebolla	Alternariosis	<i>Alternaria porri</i>	0.2	-	21	1.0 ¹ , 0.15 ² , 0.03 ³
Papa	Chupadera fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.4	-	42	7.0 ¹ , 0.02 ² 0.03 ³

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos 1-Azoxystrobin , 2-Tebuconazole, 3-Prochloraz

Ver hoja informativa

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
No se conoce incompatibilidad específica. Evitar mezclar con productos de reacción alcalina o ácida.

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



CONTRACARA

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA