

PROTECTORES SOLARES

Nombre Comercial:

KANNÜ 700®

Ingrediente Activo:
Tipo:

Caolín hidrolizada
Orgánico

Concentración:

Caolín hidrolizada: 97 % p/p

Formulación

Polvo

Densidad:

-

pH:

-

Solubilidad en agua:

-

Modo de Acción:

Aplicación foliar

Proveedor:

CHEMIE® S.A.

Autorización SAG:

No corresponde

Características:

KANNÜ 700® es un protector de cultivos de última generación que forma una película translúcida, que refleja la radiación UV, IR y visible.

KANNÜ 700® mejora la eficiencia del uso del agua; mejoras en grados Brix / TSS; reducción de aborto floral; reducción de cerezas siamesas y reducción stress hídrico; frutos de mejor calidad; reducción en la caída de frutos; reducción de la alternancia de producción; aumento de rendimiento y calidad.

Compatibilidad:

KANNÜ 700® es compatible con la mayoría de los pesticidas. No debe mezclarse con clorotalonil ni azufres. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en una pequeña superficie.

Fitotoxicidad:

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.



**ABSORCIÓN
FOLIAR**



PROTECTORES SOLARES

Aplicaciones:

Cultivo	Momento de Aplicación y Observaciones
Manzanas, peras, membrillos y otras pomáceas. Frutos secos como nogales y avellanos europeos. Uva vinífera. Carozos industriales (fruta con depósito o residuo en cosecha)	1. Programa control de estrés preferencial “Temprano”: - Aplicación desde fin de floración o inicio de cuaja, a 1,25 kg/100 L de agua, seguir a intervalos de 14 a 21 días según condiciones climáticas y de huerto. - Desde la segunda o tercera aplicación utilizar dosis de 0,63 kg/100 L de agua hasta antes de cosecha. Importante: En zona Central se recomiendan dos primeras aplicaciones al 1,25 %. Última aplicación 10-20 días antes de la cosecha, incluso en especies y variedades cosechadas tarde (abril). Siempre usar surfactante. 2. Aplicación convencional o tardía para control de golpe de sol por calor y radiación: - Aplicación inicial más tarde, por lo general 30 - 40 días después de inicio de cuaja a dosis de 2,5 kg/100 L de agua. - Hacer 3 - 4 aplicaciones más a intervalos de 14 a 21 días, a una concentración de 1,25 kg/100 L de agua
Carozos y Cerezas mercado en fresco, Arándanos y otros berries, Uva de mesa, Kiwis	1. En floración: realice 1 - 2 aplicaciones en floración, evitando el riesgo de presencia de depósito o residuo de la cosecha. Aplicaciones tempranas de KANNÜ 700® en floración o prefloración, al 1,25 %, mitigarán considerablemente el daño de heladas radiativas o por inversión térmica, muy comunes en zona central y centro sur de Chile a fines de invierno e inicios de primavera. 2. En Post cosecha: 2 - 3 aplicaciones al 1,25 %. En cerezo se debe comenzar inmediatamente después de finalizar cosecha y proteger diferenciación de yemas durante los 30 - 40 días de postcosecha. Protección de follaje y madera requieren programa más prolongado.
Huertos nuevos o recién plantados, Vivero de frutales y forestales, Plantas ornamentales	Aplicar al 1,25 % cada 3 - 4 semanas, es muy estratégico y de bajo costo aplicar antes del trasplante. KANNÜ 700® prolongará fotosíntesis neta y disminuirá daño oxidativo; mejorando producción de follaje y madera en época estival. Como referencia en zona central se debe comenzar en septiembre u octubre. hacia el sur se va atrasando en 4 a 6 semanas el inicio del programa, hasta inicio de otoño.
Cítricos, paltos y olivos	Una a dos aplicaciones a fines de floración e inicio de cuaja mejorarán cuaja, retención de fruta y calibre inicial. Aplicaciones al 1,25 %. Proteger en época estival con 4 - 5 aplicaciones. Primera aplicación al 1,25 %, luego repetir cada 3 - 4 semanas al 0,63 %.
Hortalizas: De plantines como tomates, lechugas, pimientos, cebollas, cucurbitáceas (calabacín, zapallos, pepino, melones y sandías) Cucurbitáceas: Aplicar solamente a las cucurbitáceas de piel lisa.	1. Programa antiestrés preferencial “Temprano” con una baja concentración: 6,25 kg/ha en el inicio al trasplantar o justo antes de la floración. Aplicar nuevamente con intervalos de 14 a 21 días. Intervalo menor con lluvia o riego por remoción. 2. Control de quemadura del sol/daño por el calor en la estación avanzada: Aplicación inicial: 25 kg/ha. Como superficie total de 10.000 m², ajustar según separación entre hileras y cobertura del follaje. Aplicaciones siguientes: 12,5 kg/ha Reduce el maltrato del trasplante y el estrés térmico. Mejora el establecimiento de la planta y el uso del agua. Realice las primeras dos aplicaciones con un intervalo de 14 días y antes del primer evento de calor. Aumente el volumen de agua que utilice a lo largo de toda la estación en base al tamaño de las plantas.
Papas y Tomates importante	Aplicar cada 3 semanas al 1,25 %, con un mínimo de 5 kg/ha. Comenzar 30-40 días después de la plantación.

PROTECTORES SOLARES

Precauciones:

Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.