Acaristop®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN
Clofentezine..... 500 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 2264-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Peru S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306,
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
SAFAPAC Ltd
4 Stapledon Road, Orton Southgate,
Peterborough- Reino Unido
para:
ADAMA Irvita N.V.

CONTENIDO NETO: **4 Litros**
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

ADAMA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CARA

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forraje.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos
- No desatorar las boquillas soplando con la boca.
- No utilizar este envase para conservar alimentos o agua potable.
- Almacenar este producto bajo techo, en un lugar fresco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Tetrazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- **Teléfono de emergencia: CICOTOX : 0800- 1-3040; ESSALUD en línea (01) 411-8000 opción 4; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA ACEPTABILIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Acaristop es un acaricida de contacto que actúa durante las fases embrionarias (huevos) finales y el desarrollo larvario temprano, por lo que debe aplicarse en infestaciones muy tempranas, cuando se observan los primeros huevos en las hojas. **Acaristop** no actúa sobre acaros adultos.
Acaristop mezclado con aceite agrícola en dosis bajas (200 ml de aceite en 100 litros de agua) logra un buen control tanto de adultos como huevos, si las infestaciones son iniciales.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (mL/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Melón	Arañita roja	*Tetranychus cinnabarinus*	40 - 60	N.D.	0.02
Sandia	Arañita roja	*Tetranychus cinnabarinus*	40 - 60	N.D.	0.02
Zapallo	Arañita roja	*Tetranychus cinnabarinus*	40 - 60	N.D.	0.02
Duraznero	Arañita roja	*Tetranychus urticae*	60 - 80	28	0.2
Espárrago	Arañita roja	*Tetranychus cinnabarinus*	40 - 60	N.D.	0.02
Fresa	Arañita roja	*Tetranychus cinnabarinus*	40 - 60	28	2.0
Mandarina	Arañita roja	*Panonychus citri*	80	28	0.5
	Ácaro del tostado	*Phyllocoptruta oleivora*	60 - 80		
Manzano	Arañita roja	*Tetranychus urticae*	60 - 80	28	0.5
Naranja	Arañita roja	*Panonychus citri*	60 - 80	28	0.5
Palto	Acaro	*Oligonychus punicae*	60	24	0.3
Vid	Arañita roja	*Tetranychus cinnabarinus*	40 - 60	28	1.0

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos
N.D.: No determinado.
Ver otras recomendaciones de uso aprobadas para **ACARISTOP** en la hoja informativa adjunta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Máximo una (1) aplicación por campaña y año.
Realizar la aplicación cuando se observen las primeras posturas de huevos (menos de 5 por hoja).

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONTRACARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA