

FERTUM® POTASIO es una mezcla de fertilizante y bioestimulante líquido de uso foliar y fertiriego, soluble en agua, en base a Potasio complejo con extracto de algas marinas nativas de la patagonia. Formulado para corregir carencias fisiológicas de Potasio.

FERTUM® POTASIO permite una rápida absorción de los nutrientes minerales debido a la combinación con agentes complejantes naturales.

COMPOSICIÓN:		PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS:	
ELEMENTO	%p/v		
Potasio (K ₂ O)	24,0	Densidad (g/L, 20°C):	1.230,0
		pH (10%p/v):	13,8
Extracto de algas:		Solubilidad (20°C):	99 %
Macrocystis pyrifera	18,0		
CONTAMINANTES*:			
Arsénico (As)	< 0,5 mg/kg		
Cadmio (Cd)	< 0,5 mg/kg		
Mercurio (Hg)	< 0,5 mg/kg		
Plomo (Pb)	< 0,5 mg/kg		
*Límite de cuantificación: 0,5 mg/kg			

Compatibilidad:

Incompatible con productos cúpricos y altamente ácidos. Generalmente es compatible con otros elementos. Diluir antes de realizar pruebas y/o mezclar con otras sustancias. Se recomienda que **Fertum® Potasio** sea incorporado como último componente en la preparación de una mezcla.

Precauciones:

Almacenar en un lugar fresco y oscuro. No exponer a la luz solar directa. El producto puede acumular presión en el envase por lo que se recomienda abrir con cuidado. No es peligroso para el usuario y medio ambiente. No es inflamable. Si existe contacto accidental en piel y ojos lavar con abundante agua. Se recomienda usar guantes y mascarilla en la manipulación. Dejar fuera del alcance de niños y mascotas. Lejos de alimentos y bebidas.



FERTUM® POTASIO

MEZCLA DE FERTILIZANTE Y BIOESTIMULANTE DE EXTRACTO DE ALGAS MARINAS

Fecha de Fabricación: DD/MM/AAAA
Lote: PTL0000000
Fecha de Vencimiento: DD/MM/AAAA

CONTENIDO NETO
XXX L

FABRICADO EN CHILE POR
PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA SPA
Ruta V-065 Km 5 s/n, Sector Río Chico, Puerto Montt
Contáctenos en www.patbio.com



Empresa



AGITAR ANTES DE USAR



Recomendaciones de uso de **FERTUM® POTASIO**¹: USO VÍA FOLIAR Y EDÁFICO

Cultivo	Aplicación	Dosis (L/ha)	Nº Aplic.
Frutales y vides			
Arándano, frambuesa, mora, frutilla, otros berries	A partir de cuaja de los primeros frutos. Repetir cada 10-14 días.	3-5	3
Cerezo, durazno, almendro, olivo.	A partir del endurecimiento del carozo, repitiendo cada 10-14 días.	4-5	3
Naranja, palto, limonero, mandarino, otros cítricos.	Aplicar durante el crecimiento del fruto, con intervalos de 10-14 días.	3-4	4
Kiwi	A partir de 6 a 8 semanas de caída de pétalos y repetir, si es necesario, con intervalos de 10 a 14 días.	5-7	3-4
Manzano, peral, nogal membrillo, avellano europeo.	Desde fruto con desarrollo intermedio hasta inicio de toma de color, cada 5-7 días.	4-5	2-3
Uva de mesa, vinifera, pisquera.	Desde pinta con intervalos de 10-14 días.	4-6	2-3
Vegetales y/o hortalizas.			
Acelga, espárrago.	Desde 6 hojas verdaderas. Cada 10 días.	1	2-4
Alcachofa	30 días después del trasplante. Inicio de floración. Una aplicación más si se observan deficiencias.	4-5	2-4
Brócoli, Coliflor, ajo, cebolla, repollo.	A partir de 8 hojas. Repetir cada 10 días.	3-4	2-3
Curcubitáceas	Desde floración hasta crecimiento y desarrollo del fruto.	2	3-4
Papa	Desde floración hasta llenado de tubérculos.	4-5	2-3
Tomate, Pimiento, ají, Berenjena.	A partir de 8 hojas verdaderas. Cada 10 días.	2-3	3-4

¹ La empresa no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudiesen resultar del uso indebido de este producto o que esté fuera de las indicaciones y recomendaciones señaladas.