

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizar para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Butenolide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM: 0800-50847 SAMU: 106 Bayer S.A: 01-2113800

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración y cuando se constate presencia o vuelo de abejas. No aplicar con malezas en floración.
- No aplicar este producto a una distancia menor de 10 metros de áreas donde puedan existir plantas en floración, áreas protegidas, apiarios, meliponarios o hábitats de abejas nativas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar.

© = Marca Registrada del grupo Bayer



Sivanto[®]
Prime

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:
Flupyradifurone, 200 g/l
Aditivos, csp 1 L

R. O. AQUA N. 1537-SENSA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín.
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

Formulado por:
Bayer AG
Alte Heerstrasse
41538 Dormagen
Alemania

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín.
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 5 litros

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Sivanto Prime es un insecticida de acción translaminar y sistémica constituido por el ingrediente activo Flupyradifurone, perteneciente a la clase química Butenolide.
- El ingrediente activo Flupyradifurone actúa ocasionando una excitación de la célula nerviosa, no pudiendo ser inactivado por la acetilcolinesterasa. Esto resulta en un trastorno del sistema nervioso y luego en la muerte del insecto tratado.
- GRUPO IRAC: 4D
- Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el tanque con agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	%	l/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	--	0.75	14	0.8
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	--	0.75	3	0.7
Frijol	Chicharrita	<i>Empoasca kraemeri</i>	--	0.6	7	0.01
Mandarina	Minador de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.125	1	60	1.5
	Queveza coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	--	2		
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	--	0.75-1	3	0.9
Arroz	Sogata	<i>Tagosodes orizicolus</i>	--	0.5	30	1
Arándanos	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	--	1	7	4
Palto	Fiorinia	<i>Fiorinia floriniae</i>	--	1.5	60	0.6
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus citri</i>	--	2	120	3

PC= Período de carencia (días) LMR= Límite Máximo de Residuos(ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En el cultivo de vid, se recomienda 1 aplicación por campaña a través del sistema de riego (drench) durante el brotamiento, aproximadamente 3 semanas después de la poda. (BBCH 15)
En los cultivos de palto y mandarina realizar 1 aplicación al cuajado de frutos (BBCH 71-74).
En el cultivo de arándanos se recomiendan 2 aplicaciones, una desde el desarrollo de follaje hasta pre floración (BBCH 21-54) y otra al momento de la fructificación (BBCH 67-75).
Para los demás cultivos mencionados en el cuadro de uso, se recomienda de 1 a 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año, previa evaluación de la presencia de la plaga y rotando con grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD:


Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.
No mezclar con fungicidas azoles.

FITOTOXICIDAD:

Sivanto Prime posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



- Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone 293 C, Pantone 286 C y Pantone 368 C