ADAMA

Rimon® Duo

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN
Novaluron .....50 g/L
Bifenthrin .....50 g/L
Aditivos ..... c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 1600 - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N° 7-53 Int
Zona Franca Barranquilla, Colombia

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Contenido neto: **5 LITROS**
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

Cara

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es dañino, no ingerir ni inhalar la aspersión.
- Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas se debe utilizar para conservar alimentos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No desatorar las boquillas soplando con la boca.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Benzoilfenil urea + Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos mantenga el párpado abierto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- NOTA AL MÉDICO: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Rimon Duo es un plaguicida de acción combinada (contacto + ingestión) que suma la acción de los insecticidas piretroides y benzoil ureas, logrando un control inmediato y prolongado efecto residual. Se recomienda especialmente para el control de larvas fitófagas y adultos de insectos masticadores.
Agitar bien el envase antes de abrir. Llenar el tanque del equipo hasta la mitad, preparar una pre-mezcla en un balde agua, incorporarla al tanque de aplicación y adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Mantener en marcha el sistema de agitación durante la aplicación.
Aplicar con equipo de pulverización terrestre. Previo a la aplicación asegurarse de su buena condición de uso y calibración. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Esperar a que el rocío se seque antes de aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		PC	LMR
		(L/200L)	(L/Ha)	(días)	(ppm)
Pimiento	Gusano perforador del fruto (*Heliothis virescens*)	-	0.75 - 1.0	7	0.5[1]/ 0.7[2]
Frijol	Gusano medidor (*Chrysodeixis includens*)	0.2	-	14	0.3[1]/ 0.1[2]

P.C.: Periodo de Carencia
LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón). [1]Bifenthrin / [2]Novaluron

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVO	Nº Aplic/campaña	Campañas/año	Intervalo entre aplicaciones
PIMIENTO	1	1 - 2	-
FRIJOL	2	2	10 días

Momento de aplicación
Pimiento: Se recomienda utilizar la dosis mas baja tan pronto se observen las primeras larvas y/o daños en campos infestados hasta con 20% de plantas infestadas.
Frijol: Iniciar las aplicaciones cuando la evaluación registra una larva por planta o se observen los primeros daños.

PERIODO DE REINGRESO
Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
No mezclar con sustancias de fuerte reacción alcalina. En caso de mezclas con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contracara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm