



Fiore

Biopromotor Órgano-Mineral en Base a Aminoácidos, Polisacáridos y Nitrógeno.

DISRUPTOR DE LA DORMANCIA.

Contenido neto

20 L

Elaborado por

BIOLCHIM S.p.A.

Via San Carlo, 213040059-Medicina (BO)
ITALIA

Distribuido por

AnasacChile S.A.
Almirante Pastene 300
Providencia, Santiago de Chile
Tel: (56 2) 2470 6800



Composición

RIQUEZAS GARANTIZADAS:		p/p	p/v
Nitrógeno (N) Total		8,7 %	10,00 %
Nitrógeno (N) Orgánico Total		0,7 %	0,8 %
Nitrógeno (N) Nitrico		4,0 %	4,6 %
Nitrógeno Amoniacal		4,0 %	4,6 %
Carbono Orgánico		5,5 %	6,32 %
PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICOS			
Solubilidad en agua			100% a 20°C
Densidad			1,15 g/ml a 20°C
pH (al 1%)			5,6 - 7,6 a 20°C
METALES PESADOS			
Arsénico	< 0,5 mg/kg	Plomo	< 0,5 mg/kg
Cadmio	< 0,5 mg/kg	Mercurio	< 0,5 mg/kg

Características

FIORE es un gel concentrado diseñado para uniformar y sincronizar el despertar de las yemas latentes y con esto, la floración y cuaja de los frutos. FIORE proporciona nutrientes (polisacáridos, aminoácidos y nitrógeno) que promueven la actividad de las enzimas en los tejidos de las yemas, estimulando la brotación. FIORE no es fitotóxico y es inocuo para los operarios, maquinarias y el ambiente.

Recomendaciones de uso

Cultivo	Dosis	Época de uso	Observaciones
Almendro	5 L / 100 L agua	35 a 30 días antes de inicio de brotación	Aplicar en mezcla con Nitrato de Calcio al 6% (6 L / 100 L agua)
Cerezo	5-6 L / 100 L agua	55 a 45 días antes de plena flor	Aplicar en mezcla con Nitrato de Calcio al 6% (6 L / 100 L agua). En el caso de uso de Cianamida Hidrogenada, aplicar 5 días después de esta
Nogal	5 L / 100 L agua	35 a 30 días antes de inicio de brotación	Aplicar en mezcla con Nitrato de Calcio al 6% (6 L / 100 L agua)

Compatibilidad

Realice una prueba de mezcla para comprobar la compatibilidad con otros productos. No mezclar con productos a base de cobre.