

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manejo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol + Estrobilina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800-1-3040
INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Custodia®

32 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole 200 g/L
Azoxystrobin 120 g/L
1,2-benzisotiazolin-3-one 0.4 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 675- SENASA

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V.
Sucursal Colombia.
Calle 1C N° 7-53 Interior
Zona Franca, Barranquilla
Colombia.

CONTENIDO NETO: **500 ml**

Lote No.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Custodia 32 SC es un fungicida sistémico con efecto preventivo, curativo y erradicante, de prolongada residualidad que asegura la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo. Agitar el envase antes de abrir. Preparar la mezcla de aplicación de acuerdo a las dosis indicadas en el cuadro de usos. Usar las dosis más bajas para aplicaciones preventivas o en estados iniciales de la enfermedad. Alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	(L/200L)		
Alcachofa	Oídiosis	Leveillula taurica	0.4 - 0.5	-	7	0.6 / 5.0 ²
	Pudrición gris	Botrytis cinerea				
Arroz	Quemado del Arroz	Pyricularia oryzae	0.5 - 0.7	-	35	2.0 / 5.0
Café	Roya del café	Hemileia vastatrix	-	0.3	30	0.1 / 0.02
	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	0.5	-		
Cebolla	Pudrición gris	Botrytis cinerea	0.4	-	14	0.1 / 1.0
Espárrago	Mancha foliar	Stemphylium vesicarium	0.6	-	20	0.02 / 0.01
Fresa	Oídiosis	Oidium sp.	-	0.20-0.25	5	0.1 / 10
	Pudrición gris	Botrytis cinerea	-	0.25-0.30		
Maíz	Mancha del Asfalto	Phyllachora maydis	-	0.2 - 0.3	15	0.6 / 0.02
Mandarina	Pudrición gris	Botrytis cinerea	-	0.2	15	5.0 / 15.0
	Alternaria	Alternaria alternata	-	0.15 - 0.2		
Mango	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	-	0.15 - 0.25	52	0.05 / 0.7
Melocotonero	Oídiosis	Sphaerotheca pannosa	-	0.15 - 0.20	3	1/2
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.5 - 0.7	-	nd	0.02 / 1.0
Pimiento	Oídiosis	Leveillula taurica	0.4 - 0.6	-	7	1.0 / 3.0
	Oídiosis	Erysiphe necator				
Vid	Pudrición gris	Botrytis cinerea	0.5	0.18 - 0.24	14	6.0 / 2.0

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)
nd: no determinado 1-Tebuconazole / 2 - Azoxystrobin

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 230 mm x 120 mm

ESTA ETIQUETA REQUIERE HOJA INFORMATIVA