

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere, tóxico por inhalación, es nocivo por contacto con la piel.
- Utilizar ropa con capucha durante la aplicación del producto y para reingresar al área tratada.
- No comer, ni beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conserva alimento o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto lavar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco y alejado del calor seco y bajo llave.
- No almacenar en casa habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

-GRUPO QUÍMICO: PIRETROIDE

- **En caso de ingestión:** Llame o acuda a un médico inmediatamente y de información de la etiqueta. No induzca al vómito a no ser que sea voluntario o recomendado por el médico.
- **En caso de inhalación:** Llevar al paciente a un lugar sombreado, con aire fresco. Si no respira, practicar respiración artificial boca a boca. Solicitar asistencia médica.
- **En caso de contacto ocular:** Irrigar los ojos expuestos con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente por lo menos 15 minutos. Si persisten la irritación, el dolor, la hinchazón, la lacrimación, o la fotofobia, el paciente debe recibir ayuda médica.
- **En caso de contacto cutáneo:** Quite la ropa contaminada y lave completamente el área expuesta con jabón y agua. Puede necesitar asistencia médica si la irritación o el dolor persisten.
- **Antídoto:** No tiene.

EMERGENCIAS: Llamar a CICOTOX: 0800-13040, CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 411 8000 anexo 4. 0800 - 10 - 828.CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Aplicar de preferencia por las mañanas.
- Peligroso para organismos acuáticos.

ALFAMIL®

10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Alpha-cypermethrin 100 g/L
Aditivosc.s.p. 1 Litro

N° DE REGISTRO: PQUA N° 1100 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



**IMPORTADOR Y
DISTRIBUIDOR:**

FORMULADO POR:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED.

Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: **1 Litro**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ALFAMIL 10 EC es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la enzima colinesterasa. Es usado para el control de gusano cogollero en espárrago.

Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **ALFAMIL 10 EC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otro

“CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO ”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	L/200L de agua	L/ha		
Espárrago	*Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.15	--	14	0.1
Páprika	*Gusano del fruto*	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.2	0.35	14	0.1

PC:** Periodo de Carencia. *L.M.R.:** Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una aplicación al año, cuando la plaga esté presente.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar hasta después de transcurridas 24 horas de la aplicación, verificando que la aspersión se haya secado sobre la superficie tratada.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta, a excepción del caldo bordelés, cal de azufre y aceites agrícolas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

