



NITRÓGENO FOLIAR DE LIBERACIÓN CONTROLADA

COMPOSICIÓN EN p/p

Nitrógeno Total 25% p/p

18,96% p/p..... Nitrógeno Ureico

6,04% p/p..... Nitrógeno liberación controlada

(Urea Formaldehído: Metilen Urea y Metilen Diurea)

Solubilidad en agua a 20°C: 100%

pH: 9,6

Densidad (g/L a 20°C): 1.180

Contenido de Metales Pesados:

Hg <0,2 mg/kg, Cd <2 mg/kg, As <2 mg/kg, Pb <5 mg/kg

Formulador
AGROENFOQUE S.A
RUTA 5 - KM29
CAMINO LA LUCHA 5/N Y CAMINO
DELBONO, CP90300 CANELONES,
URUGUAY

CONTIENE
20 Litros

IMPORTADO POR

 **M&V**
MARTINEZ & VALDIVIESO

Av. Andrés Bello 2711, piso 13 oficina
1301, 7550611 Las Condes, Región
Metropolitana.
+56 2 3275 5500
www.myv.cl

Especie		Dosis	Recomendaciones de uso
Cultivos y Hortalizas	Raps	3 a 20 L/ha	Aplicar 10 L/ha en estado de roseta.
	Lupino		Aplicar desde etapas iniciales de desarrollo vegetativo hasta floración, repitiendo cada 10 a 14 días. Realizar 1 a 3 aplicaciones por temporada.
	Trigo		Aplicar desde primer nudo (Z31) hasta hoja bandera (Z47). Realizar 1 a 2 aplicaciones de 10 L/ha c/u. No mezclar con herbicidas post emergentes.
	Maíz		Para rendimiento aplicar 20 L/ha entre V6 y V9. Para ayudar al desarrollo inicial del cultivo se pueden aplicar 5 L/ha entre V2 y V4. Para calidad de grano aplicar 10 L/ha a inicio de panoja. No mezclar con herbicidas post emergentes.
	Maravilla		Aplicar durante el desarrollo vegetativo, entre estado V6 y antesis, se puede repetir en cuaja. Realizar 1 a 3 aplicaciones.
	Frejol y Soya		Aplicar desde V3 en adelante hasta prefloración (R5), repitiendo cada 10 a 14 días. Se puede repetir en formación de vainas (R7). Realizar 2 a 4 aplicaciones por temporada.
	Arroz		Aplicar 10 L/ha a inicio de desarrollo de panícula (R1).
	Remolacha y Achicoria		Aplicar desde etapas iniciales del desarrollo vegetativo para potenciar el cierre de hileras cada 10 a 14 días. Repetir en verano junto con aplicaciones de Boro y/o fungicidas. Realizar 2 a 4 aplicaciones por temporada.
	Hortalizas de Hoja		Aplicar 15-20 días post trasplante con metabolismo activo repitiendo cada 10 a 14 días.
	Poroto verde y Arveja		Aplicar durante el desarrollo vegetativo repitiendo cada 10 a 14 días. En cuaja aplicar para potenciar el rendimiento. Realizar 2 a 3 aplicaciones por temporada.
	Tomate		Aplicar durante el desarrollo vegetativo repitiendo cada 10 a 14 días. En cuaja aplicar para potenciar el rendimiento. Realizar 2 a 3 aplicaciones por temporada.
	Zanahoria, Cebolla, Bunching		Aplicar con plantas desde 10 a 15 cm del altura durante todo el ciclo del cultivo repitiendo cada 10 a 14 días.
	Cucurbitáceas		Aplicar desde 4 a 6 hojas cada 10 a 14 días. Repetir la aplicación en cuaja. Realizar 2 a 4 aplicaciones por temporada.
	Papa y Bulbos		2 a 5 aplicaciones cada 10 a 12 días desde inicio de tuberización, dosis: 5 L/ha.
	Praderas		Aplicar 10 L/ha en primavera para activar el crecimiento, se puede repetir 7 a 10 días después de cada corte en dosis de 5 a 10 L/ha.
Frutales	Vides	0,3% a 1%	Desde inicio de brotación hasta preflor realizar 1 a 3 aplicaciones (según condición del huerto) cada 14 días de 0,3 a 0,5%. En post cuaja hasta cierre de racimo realizar 1 a 2 aplicaciones de 0,3 a 0,5%. En post cosecha hacer 2 aplicaciones de 0,5 a 1% cada 10 a 14 días.
	Carozos (Cerezos, Nectarines, Durazneros, Damascos, Alendros, Ciruelos Japones y Europeo)		Realizar 1 a 3 aplicaciones (según condición del huerto) desde fin de flor hasta viraje de color cada 14 días de 0,3 a 0,5%. En post cosecha realizar 2 aplicaciones cada 10 a 14 días de 0,5 a 1%.
	Berries (Arándano, Frambuesa y Frutilla)		Desde inicio de brotación hasta desarrollo de fruto hacer 1 a 3 aplicaciones (según condición del huerto) al 0,5% cada 14 días.
	Nogal		Aplicar desde fruto cuajado en adelante al 0,3 a 0,5% cada 14 días. Realizar 1 a 3 aplicaciones en la temporada.
	Avellano Europeo		Desde inicio de brotación realizar 1 a 3 aplicaciones (según condición del huerto) al 0,5% cada 14 días.
	Pomáceas (Manzano y Peral)		Realizar 1 a 3 aplicaciones (según condición de huerto) desde caída de pétalos en adelante de 0,3 a 0,5% cada 14 días. En post cosecha realizar 2 aplicaciones cada 10-14 días de 0,5 a 1%.
	Plantaciones Nuevas		Aplicar en dosis de 0,5 a 1% cada 14 días cuando exista crecimiento activo.
	Persistentes (Clementinas, Pomelos, Naranjos, Limoneros y Patos)		Una aplicación en prefloración y repetir en post cuaja. Durante desarrollo vegetativo realizar 1 a 3 aplicaciones (según condición del huerto).

Preparación de la Mezcla

Para preparar el caldo, llene el tanque hasta la mitad, ponga el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida de Coron 25-0-0, adicione los líquidos floables y luego los polvos solubles y por último adicione el resto del agua hasta completar el volumen total requerido y siga agitando hasta completar.

Almacenamiento y Transporte

Guárdese bajo llave y lejos de los alimentos, granos, semillas y forrajes. Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. En caso de derrames recoger el producto. No transportar junto a productos alimenticios, ropa, semillas, forrajes y fertilizantes, asegure el producto durante su transporte.

Precaución

Se recomienda seguir las indicaciones de etiqueta; aplicar con maquinaria debidamente calibrada y con operarios competentes; realizar las aplicaciones en condiciones de mejor absorción (al iniciar o finalizar el día).

Medidas de protección al medioambiente

No contaminar los ríos, estanques o depósitos de agua al lavar el equipo de aspersión, transportar y almacenar los fertilizantes lejos de los alimentos y forrajes.

Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos utilizados en la Agricultura, sin embargo, no se debe utilizar con productos con un historial de fitotoxicidad fungicidas cúpricos, emulsiones concentradas y formulaciones en base a aceites (minerales y vegetales).

NO USE EL PRODUCTO EN FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN ESTA ETIQUETA.

Fecha Venc.:
Lote:

¡ALTO! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO

El fabricante garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencimiento y sus productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable para evitar la manipulación y adulteración de estos. Siguiendo las indicaciones de etiqueta no debiesen existir daños asociados a la aplicación del producto, sin embargo, siempre existe la posibilidad que factores externos incidan negativamente y tanto el fabricante como el distribuidor no se hacen responsables de daños que puedan surgir por no seguir las indicaciones de la etiqueta o por factores externos a ellos (medioambientales o agronómicos). Por lo anterior, se recomienda aplicar en horarios frescos, usar el producto bajo la recomendación de una persona o institución calificada para ello y apoyarse de análisis nutricionales en forma permanente. Lea las condiciones de venta, garantías y limitaciones de responsabilidad y recursos antes de usar este producto. Si los términos no le parecen aceptables, devuelva el producto sin abrir y el precio de compra le será reembolsado.