

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Durante su manipuleo use ropa, máscara y guantes protectores. Evitar el contacto con la piel e inhalar al momento de la aplicación. Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación. No comer ni fumar durante la aplicación luego lavarse con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa.
 -No aplicar en dirección contraria al viento. No verter el resto del caldo de aspersión sobre vegetación útil y fuentes de agua (lagos, ríos, estanques, acequias). Usarlo de su envase original y almacenarlo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
 -No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes y medicinas. Evitar el contacto de aves con el producto aplicado.

PRIMEROS AUXILIOS:

-Grupo químico: Neonicotinoides
 -Acudir de inmediato al médico, entretanto, hacer reposar al paciente en un ambiente fresco, no desabrigarlo, lavar las partes expuestas al contacto.
 -En caso de ingestión oral se da a beber mucha agua (no dar leche ni alcohol) y una suspensión de carbón medicinal de 10 mg en 150 a 200 ml de agua cada 4 a 6 horas hasta la mejora del paciente.
 -Inducir el vómito sólo si el paciente está consciente. Dar de beber mucho líquido para forzar la diuresis.
 -En caso de contacto con los ojos lavar con agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

-**Antídoto:** No se ha determinado un antídoto específico.

-Indicaciones para el médico:

El médico instituirá un tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 -Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 -Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

-No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.

-Aplique el producto como se indica en la etiqueta.

-Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

-En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

-No aplicar en épocas de floración del cultivo objetivo o de los cultivos colindantes.

-**Peligroso para abejas y fauna benéfica.**



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Imidacloprid, 350 g/L
 Aditivos, csp 1 litro

Reg. PQUA N°028-SENSA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
 Paseo de la República 3074
 Lima - Perú

Formulado por:
 Bayer S.A.
 Av. Américas 57-52
 Bogotá D.C.-Colombia

Importado y distribuido por:
 Bayer S.A.
 Paseo de la República 3074
 Piso 10 San Isidro
 Lima - Perú

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 1 litro

Lote N.
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada del grupo Bayer

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Insecticida sistémico del grupo de los cloronicotinilos. Tiene efecto de contacto estomacal e ingestión. Nuevo modo de acción contra poblaciones de insectos resistentes a insecticidas piretroides y fosforados.

Preparación de la mezcla: Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua limpia, agregar la dosis recomendada para cada plaga y cultivos, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Aplicación al follaje

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	%	L / ha ml/cál		
Algodón	Pulgón de primavera	Aphis gossypii	-	0.075 0.12	75 120	14
	Pulgón en Algodón maduro (Piura, Lambayeque)	Pulgón de verano	-	0.3	200-300	
	Arrebatado	Dysdercus peruvianus	-	0.3	200-300	
Mandarina	Minador de hoja de los cítricos	Phyllocnistis citrella	-	-	50-100	30
Naranja	Pulgón	Toxoptera auranti	-	-	100	
Mandarina	Mosca Blanca	Aleuricoccus floccosus	-	-	100	
Limón	Queveza comá	Lepidosaphes beccii	-	-	140	1.0
	Queveza redonda	Selenaspilus articulatus	-	-	140	
Espárrago	Mosquilla de los brotes o Cecidomido	Protopsis longifolia	-	0.3	150	3
Tomate			-	0.5	200	
Aji			-	-	-	n.a
Marigold			-	-	-	n.a
Arroz	Sogata	Sogatodes orizicola	-	0.1- 0.15	50 - 75	21
Frijol	Cigarritas	Empoasca fabae	-	0.16	80	14
Vid	Floxera	Phylloxera vitifoliae	-	-	100	21
Arándanos	Mosca blanca	Aleuricoccus juliscae	0.1	-	-	3
	Utilización en trampas					
Mango	Mosca de la fruta	Anastrepha spp.	-	-	50	30

* PC = Periodo de carencia (días) **LMR= Límite Máximo de Residuos (ppm) n.a = No aplica

Aplicaciones al suelo tipo "drench" y al sistema de riego por goteo.

Cultivo	Nombre Común	Nombre Técnico	Dosis (l / Ha)	Método	PC* (días)	LMR** (ppm)
Tomate	Protopsis	Protopsis longifolia	0.75-1.0	Aplicar el caldo del insecticida en "drench" 100 ml directamente a la zona de la raíz en cada golpe de siembra llegando a la dosis de 0.75 a 1 litro.	3	0.05
Aji	Mosca blanca	Bemisia argentifolii		En el caso de sistema de riego por goteo aplicar por medio de tanques de fertilización. Regar antes de aplicar y regar posteriormente.	3	0.05
Pimiento					3	0.05
Vid	Floxera	Phylloxera vitifoliae	1.5	En el caso de sistema de riego por goteo aplicar por medio de tanques de fertilización. Regar antes de aplicar y regar posteriormente.	21	1.0
Espárrago	Protopsis	Protopsis sp.	1.5		3	0.05
	Trips	Thrips tabaci				
Mandarina	Minador de las hojas de los cítricos	Phyllocnistis citrella	1 cc. de Confidor por año planta en campo definitivo desde el trasplante hasta los 3 años.	Diluir la cantidad necesaria de Confidor en 2 a 3 litros de agua y aplicar la dilución hasta humedecer bien el área radicular.	30	1.0
Vid	Planococcus	Planococcus citri	1.5	Aplicar en etapa de floración o en etapa de actividad radicular. Aplicar en inyección al sistema de riego, fraccionando el tiempo de riego en 3 partes: regar, inyectar el producto y regar al finalizar.	30	1.0

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: Aplicar previa evaluación y según nivel de daño económico. No aplicar en periodos de floración ya que puede ser tóxico a abejas. Se recomienda tres aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

Precaución: No mezclar con abonos foliares.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



- Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone Yellow C, Pantone 286 C y Pantone 368 C