

¿QUÉ ES?

Carboxigram Zn[®] es un fertilizante foliar formulado con Zinc y quelatos de bajo peso molecular. Esta sinergia permite obtener carboxilatos de Zinc de alta solubilidad y biodisponibilidad.

El Zinc facilita la elongación de los tejidos, ya que es un cofactor importante que acelera procesos metabólicos clave para las plantas. Además, mejora la calidad de las cosechas y aumenta el crecimiento de los cultivos.

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original, en un lugar seco, fresco y ventilado.

Tiempo de almacenaje: 12 meses a partir de la fecha de elaboración.

RESTRICCIONES DE USO

No aplicar con lluvias.

Respetar las dosis recomendadas según estado fenológico

PRECAUCIONES

Utilice elementos de protección personal (EPP) acordes al tipo de aplicación.

Evitar inhalación. No coma, fume o beba durante su manipulación.

Para mezclar con otros productos, contacte al departamento técnico de Fitotecnología. (contacto@fitological.com)

COMPOSICIÓN

ZnO 0,75% p/p

METALES PESADOS

Arsénico <0,2 mg/kg
Cadmio <0,1 mg/kg
Mercurio <0,5 mg/kg
Plomo <0,5 mg/kg

COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICA

pH: 2,5 – 3,1
Densidad a 20°C: 0,99 g/ml
Solubilidad a 20°C: 100%

TIEMPO DE REINGRESO
No presenta

CERO RESIDUOS

APLICACIÓN

Agite perfectamente el envase del producto antes de utilizar. Utilice equipo de protección personal acorde al tipo de aplicación. Mezcle en dosis recomendadas. Una vez terminada la aplicación, realice lavado de equipos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	CONCENTR. cc/100 L.
FRUTALES DE NUEZ Avellano europeo, nogal, almendro, castaño, olivo	Desde puntas verdes hasta post cosecha	200 a 300 cc/100 L. agua
CAROSOS Duraznero, ciruelo, cerezo, nectarin		
BERRIES Arándano, frutilla, frambueso		
POMÁCEAS Manzano, peral		
KIWIS	Desde brote en crecimiento hasta post cosecha	
VIDES Uva de mesa, uva de vino		
PALTOS		
CÍTRICOS Mandarino, limonero, naranjo	Durante crecimiento y desarrollo vegetativo hasta cosecha	
CULTIVOS Maíz, trigo, avena		
HORTALIZAS Tomate, zapallo, papa, melón, sandía, ají, pimentón, pepino, cebolla, lechuga	Durante crecimiento y desarrollo vegetativo hasta post cosecha	100 a 150 cc/100 L. agua

PARCELA 16 LOTE C, SECTOR PANIMÁVIDA, COLBÚN

+56 9 3344 8944 contacto@fitological.com

WWW.FITOLOGICAL.COM