"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios bebidas, forrajes, medicinas, entre otros. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Después de terminada la aplicación lavarse todas las partes del cuerpo con abundante agua y jabón y cambiarse de ropa.
Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa.
Manejese en envases originales, almacenándolo herméticamente en lugares frescos y secos alejado del alcance de los niños y animales.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Propamocarb (carbamato), Fluopicolide (Acyl Picolide)
En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muestrele esta etiqueta. Mantenga al paciente en una zona ventilada y en posición de descanso. De soporte respiratorio si es necesario. No induzca al vómito.

Indicaciones para el médico
Tratamiento sintomático y de soporte. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

Antídoto
Tratamiento sintómatico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CISPROQUIM: 0800-50847 SAMU: 106 Bayer S.A: 01-2113800

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido del envase, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FUNGICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Propamocarb HCl, 625 g/L
Fluopicolide, 62.5 g/L
Aditivos, csp 1 l

Reg. PQUA N. 259-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín.
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

Formulado por:
Bayer S.A
Carrera 50 Calle 8
Soledad
Barranquilla
Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Calle Amador Merino Reyna N. 223
Interior 802, Urb. Jardín.
San Isidro, Lima - Perú.
Telf. 2113800

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**
NO INFLAMABLE

Contenido Neto: 500 ml

Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Nº de lote:

® = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Infinito 688 SC es un fungicida formado por dos ingredientes activos complementarios Fluopicolide y Propamocarb. Fluopicolide tiene actividad antiesporulante y un buen potenci curativo específico contra hongos del genero oomycetos, Propamocarb influye en el metabolism del hongo actúa como antiesporulante e inhibe la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos.
Infinito 688 SC es un fungicida preventivo y curativo con acción translaminar y un novedoso mod de acción; detiene el movimiento de las zoosporas y las destruye en solo unos segundo constituyéndose como un producto eficaz en el control de Phytophthora infestans en el cultivo d papa.

Agite el producto antes de utilizarlo. Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Llenar tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En recipiente aparte mezclar producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			LMR (ppm)	PC (días)
	Nombre común	Nombre técnico	%*	ml/cil.*	l/Ha		
Papa	Rancha	*Phytophthora infestans*	0.3-0.4	600-800	1.5-2	0.5 (1) 0.02 (2)	7
Quinua	Mildiu	*Peronospora farinosa*	--	500	--	0.1 (1) 0.01 (2)	80

PC = Periodo de carencia LMR = Límite máximo de residuos

(1): LMR Propamocarb (2): LMR Fluopicolide

* Emplear la dosis en porcentaje (%) o ml/cilindro cuando se use pulverizadora manual; para aplicaciones e avión, tractor o mochila a motor emplear la dosis en l/ha previa calibración del gasto de agua por Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar al inicio de síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar dos aplicaciones po campaña dentro de un programa de manejo integrado.

PERIODO DE REINGRESO: A las 12 horas.

COMPATIBILIDAD:
Compatible con productos comúnmente usados en agricultura, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar. No mezcle con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD:
Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones y dosis establecidas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqu recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. S requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor de producto."

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

20 Mayo 2004 - Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone Yellow C, Pantone 340 C y Pantone 376 C