

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir ni inhalar la aspersión.
- Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas se debe utilizar para conservar alimentos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No desatorar las boquillas soplando con la boca.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzoilfenil urea + Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos mantenga el párpado abierto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- **NOTA AL MÉDICO:** No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



ADAMA

Rimon® Duo

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Novaluron 50 g/L
Bifenthrin 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PGUA N° 1600-SENASA

Titular de Registro:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 306.
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000



Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60
Beer Sheva 8410001, Israel.

Importado y Distribuido por:
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 306.
Santiago de Surco, Lima - Perú.



Contenido neto: **500 ml**

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Rimon Duo es un insecticida de acción combinada (contacto + ingestión) que brinda control inmediato y prolongado de larvas fitófagas y adultos de insectos masticadores.

Rimon Duo se aplica en aspersión directa al follaje con equipo de pulverización terrestre. Esperar que el rocío se seque antes de aplicar y mantener en marcha el sistema de agitación durante la aplicación.

Consulte con ingeniero agrónomo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/Cil)	(L/Ha)		
Arándano	Gusano perforador del fruto	<i>Heliothis virescens</i>	0.3	-	7	1.8' / 7 ²
Brócoli	Gusano de la col	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	-	7	0.4' / 0.7 ²
Frijol	Gusano medidor	<i>Chrysodeixis includens</i>	0.2	-	14	0.3' / 0.1 ²
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.3	-	100	0.05' / 0.05 ²
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.2	-	30	0.5' / 0.6 ²
Pimiento	Gusano perforador del fruto	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.75-1.0	7	0.5' / 0.7 ²
	Polilla	<i>Symmetrischema capsicum</i>	-	0.75-1.5		

P.C.: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón).
1-Bifenthrin / 2-Novaluron

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar hasta dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 días. Considerar una (01) campaña al año en los cultivos de arándanos, paltos y pimientos, y dos (02) en brócoli, frijol y maíz.

Momento de aplicación

Ver la hoja informativa.

PERÍODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver hoja informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Dimensiones : 230 mm x 120 mm

Esta etiqueta requiere Hoja Informativa